

Bulletin Général



Observations	Stade(s)	N° 1 lundi 15 avril 2010 AB AGRICULTURE BIOLOGIQUE
<p>Nombreux Stades : Bourgeon d'Hiver à 2-3 Feuilles étalées, Majorité Bourgeon dans le Coton.</p>		

Du Côté Des MALADIES...

<i>Excoriose</i>	Risque Moyen à Elevé Observer les Bois de tailles (pycnides & cléistothèces), des lésions brun marron, avec des striations perpendiculaires d'aspect liégeux. C'est le faciès "plaquette de chocolat". Pas de Traitement avant que 30 % des Bourgeons soient Débouffés.
<i>Mildiou</i>	Risque Faible à Moyen , Pas plus d'Infos de Modélisation pour l'Instant. Les conditions climatiques hivernales ont été favorables, la maturation des œufs d'hiver ne devrait plus tarder (déjà observer par la FREDON en condition Labo, pas encore en Extérieur). Actuellement la végétation devient de plus en plus réceptive (même si le stade de réceptivité lui, ne l'est pas encore).
<i>Black Rot</i>	Risque Moyen à Elevé : Porté une Attention particulières aux parcelles ayant subi des dégâts en 2009. Attention le Black rot a des besoins (T° & Humidité) moindres que ceux nécessaires au Mildiou. Les contaminations sont généralement plus précoces que le Mildiou.
<i>Botrytis</i>	Risque Faible : Pensez à Privilégiez Prophylaxie. Maintenez un couvert végétal aussi longtemps que possible
<i>Oidium</i>	Risque Faible à Moyen : Rechercher les éventuels symptômes sur rameaux. Surveiller les parcelles ayant subies des dégâts ces 2 dernières années. Surveiller parcelles à Historique Sensible.

Restez attentifs à l'évolution des conditions météorologiques sur votre Zone & au stade végétatif de la vigne. Suivant les secteurs & les parcelles la végétation est plus ou moins avancée (de Bourgeon dans le Coton à 2-3 Feuilles étalées). Privilégié la Prophylaxie : Brûlez les Bois Morts (de plus de 2 ans), Eliminez les Excès d'eau & favorisez sa circulation..... **Conservez les couverts inférieurs de 30 cm par rapport aux bourgeons, évitez de travailler les sols Inters Rangs mais attention à ne pas se laisser dépasser sous le Rang.** Attention !! à ne pas tondre trop ras, laissez 8-10 cm de couvert si possible. En Attente d'une Définition plus précise du Risque Maladie, l'évolution du risque sera fonction des conditions météo des jours à venir (eau & T° notamment) .

Les Traitements peuvent être commencés sur parcelles Très Précoces et/ou Zones sensibles ! Parcelle à risque (bas Fond Humide, mauvaise circulation de l'air & de l'eau) : 2 à 8 Kg de Soufre , Si pluie & végétation à 2-3 Feuilles étalées + 100 à 200 g de Cuivre Métal Sulfate ou Hydroxyde. Autres Situations (Majorité), Les Traitements peuvent Attendre, La Météo de la Semaine Prochaine annonce de la Chaleur, Si Végétation développées & Pluies Annoncées : Être couvert Cu & Soufre !!! Autrement Attendre Prochain Bulletin.

Excorsiose 1^{er} Traitement : 30 % bourgeons débouffés & 2nd Traitement à partir de 2-3 Feuilles étalées : Sur parcelle sensible ou touchée : Bouillie Nantaise (sulfo-calcique à base de Soufre) à 3% ou Soufre Mouillable 1-2 Kg/hl (bien mouille, sans atteindre le point de Ruissellement).

Du Côté Des INSECTES...


<i>Cicadelles FD</i>	Réalisez de préférence un Epamprage Mécanique. Observez présence d'œufs dans l'écorce des ceps.
<i>Cicadelle Verte</i>	Veillez à Favoriser la BioDiversité des couverts à l'intérieur & à l'Extérieur des Parcelles, ainsi qu'à la Présence d'oiseaux & de Chauve Souris (Par la Mise en place de Nichoirs et/ou la préservation de Biotopes naturels).
<i>Tordeuses</i>	Les Vols ont commencé sur Monbazillac (BSV), Les Pièges peuvent être installé à l'intérieur des parcelles.
<i>Pyrales & Noctuelles</i>	Prévoir : Observez la présence des chenilles sur 10 ceps (sur bourgeons développés). Seuil de nuisibilité: 4 par cep. Traitez les pieds atteints le soir, avec de la Pyrèthre + huile blanche à la limite du point de ruissellement, jusqu'à la base des troncs. Note : on atteint que très rarement le seuil de nuisibilités, ces pratiques doivent restées l'Exception !

Notes : Surveillez la Présence d'Acariens & les dégâts sur bourgeons. Escargot : Possibilités utiliser Orthophosphate de Fer (granulé, attention au délitement en conditions humides), a épandre au sol.

Conseil : Les pièges sexuels & Confusion doivent être mis en place, Le Réseau de Piégeage ce développe & finit de ce mettre en place. Flavescence Dorée : Si Plantation en 2010, Demander des Plants Traités à l'Eau Chaude. Pensez à la Prospection & à Identifier & Arracher les pieds Malades.


Pour Aller plus Loin

Attention les Informations ci-dessous Ne Sont Valables que dans le respect de Bonnes Pratiques Agronomiques & Biologiques respectueuses du Sol & de la Plante, En Intégrant autant que Possible l'approche Globale de Son Vignoble

	<u>Quelles Préparation de Phytothérapie et/ou BioDynamie à Utiliser Actuellement ?</u>
Valériane	Utilisée pour lutter contre les gelées, (créer une peau protectrice contre le froid, mais pas contre le chaud). Plante Riche en Silice et lié au Phosphore. Possibilités Egalement utiliser préparation 507, diluée, Dynamisée ou Non (10-20mn)
Prêle	En décoction (10 %) sur le Feuillage, Pas Avant Stade Pointe Verte ! Riches en Silice & Calcium, contribue au durcissement des parois cellulaires, en lutte préventive contre de nombreuses maladies (notamment : Mildiou, Oïdium & Excoriose, Black Rot
Osier	En Tisane sur le Feuillage, Riche en acide Salicylique en lutte préventive contre le Mildiou. On utilise l'écorce ou des jeunes tiges fraîches. Si utilisation autres Saules, Evitez les Espèces à Feuilles Larges
Ortie	En purin (10 %) au sol, puis sur feuillage jusqu'à 5-6 Feuilles étalées maximum
500 ou 500 P	Applicable encore ce Mois ci, 1- 2 Pulvérisation Max, Avant débourrement ou très rapproché, trop tôt risque sensibilité gel






* N'Hésitez pas à Demander les Fiches Correspondantes à Votre technicien

Prendre en compte La Position de la Lune dans mes Travaux :

<u>Positions</u>	<u>Quels Travaux privilégiez ?</u>
-	Lune Montante, jusqu'au 18 Avril, Risque Maladie plus Important.
	Entre Le Premier Quartier & La Pleine Lune : Sortie ou Broyage des Bois de taille 2+

Prochain Nœud Lunaire : les 20 Avril & 03 Mai Prochain Périgée Le 24-25 Avril

EVITER le travail des sols et de la plante pendant les nœuds lunaires (2 par mois) et la Lune en périgée (1 par mois). * N'Hésitez pas à contacter Votre technicien pour toute informations complémentaires

<i>Symptômes Oïdium sur rameaux</i>	<i>Excoriose</i>	<i>Œuf Cicadelle Flavescence Dorée</i>	<i>Orchidée Araneola</i>	<i>Dégâts Mange Bourgeon</i>
				

Note :

Vous pouvez Actuellement Observés les Premières Fleurs d'Orchidées (Pourpres, Araneola, Occidentalis,....., Les Orchidées sont des Plantes vivant en associations avec des mycorhizes (mais également des insectes pour la reproduction, partenariats souvent spécifiques), adaptées aux terrains difficiles, souvent de type Pelouses calcaires. Leurs Présence indiquent une bonne préservation du sol (tant sur la structure que son fonctionnement). Surveillez-les ! Si Présence préférez Tonte Haute afin de les Préserver & si possible évitez de Tondre durant la Floraison.



◀ avril 2009 ▶							
l	m	m	j	v	s	d	
30	31	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30				

Prochaine Réunion Bout de Parcelles A Venir

Lieux : Les Lieux Vous Seront Communiqués dans le Prochain Bulletin

Vigneron nous recevant :

Itinéraires :

Rappel en 2010, il y aura une réunion Zone Sud (colombiers) & une Réunion Zone Ouest (saint antoine de Breuilh) ! Les Dates seront relayées sur le Site & dans les Bulletins.



Bergerac :

Fiabilité 80 %					Aquitaine							
	Temps	Températures	Pression	Vent	Matin	Ap-midi	Soirée	Nuit				
M A T I N		7°C à 9h Ressentie 2°C	1012 hPa	Vent faible d'est 10 à 20 km/h, rafales à 30 km/h	 METEO CONSULT © 2010 15/04/2010 ■ Température sous abri ■ Température ressentie °C Max 19°C Min 2°C Voir les normales saisonnières 3h 9h 15h 21h Ephémérides Lever 07h14 Coucher 20h43 Premier quart de Lune							
		ENSOLEILLE malgré quelques nuages. Sans précipitation.										
A P P M I D I		19°C à 15h Ressentie 17°C	1012 hPa	Vent faible de nord-est 10 à 20 km/h, rafales à 30 km/h								
		Beau temps peu nuageux. Sans précipitation.										
S O I R E E		13°C à 21h Ressentie 12°C	1012 hPa	Vent modéré de nord-est 20 à 30 km/h, rafales à 40 km/h								
		Beau temps peu nuageux. Sans précipitation.										
N U I T		6°C à 3h Ressentie 2°C	1014 hPa	Vent faible de nord-est 10 à 20 km/h, rafales à 40 km/h								
		CIEL CLAIR. Sans précipitation.										

Cu²⁺

■ Prévisions à cinq jours

Jour	jeudi 15	vendredi 16	samedi 17	dimanche 18	lundi 19
Dordogne					
indice de fiabilité (%)	98	92	90	87	84
Temps					
T min (°C)	1	3	3	5	6
T max (°C)	19	19	21	22	21
T min au sol (°C)	-3	-1	-1	1	2
Quantité de précip. (mm)	0,1	0	0	0,1	0,2
Risque de précip. (%)	12	9	8	13	23
Nébulosité	1/8	1/8	0/8	1/8	1/8
Humidité relative min (%)	37	38	44	43	51
Humidité relative max (%)	92	85	87	86	90
Ensoleillement (h)	11	11	13	11	11
Direction du vent					
Vitesse du vent (km/h)	13	19	11	11	11
Rafales maximales (km/h)	31	37	26	28	26
Rayonnement global (J/cm² jour)	2290	2309	2360	2345	2363
ETP (mm)	4	4	4	4	4

Tél : 06.87.58.48.50

Courriel : e.maille@agrobioperigord.fr

Eric MAILLE,
Sincères salutations,
Technicien Viticole AB

<http://www.agrobioperigord.fr>