



• AGROBIO PÉRIGORD •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

→ **Mardi 16 juin 2026**

Viticulture bio

BULLETIN TECHNIQUE N°07

PROCHAIN BULLETIN :
Mardi 23 juin

Du côté
des maladies

P 2

Du côté
des insectes

P 3

Pour aller plus loin...
La position de la Lune

P 5

Focus
Météo

P 4

Focus
technique

P 6

Historique
Réseau de surveillance

P 8



Événements à venir

SAVE THE DATE Mercredi 01 juillet : Après-midi autour des nouvelles variétés résistantes aux maladies, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de Dordogne.

OBSERVATIONS

La semaine écoulée a été marquée par une hausse marquée des températures, avec des écarts importants entre les zones les plus fraîches et les plus chaudes. Les précipitations sont restées très limitées, avec quelques pluies légères et localisées, tandis que certaines stations n'ont enregistré aucune averse.

Les conditions estivales ont favorisé une progression active des stades phénologiques et une croissance végétative soutenue. En Nord-Aquitaine, les vignes atteignent désormais des stades avancés, bien que des disparités persistent entre les parcelles, certaines étant plus précoces que d'autres. Des phénomènes de coulure, notamment sur merlot, ont été observés, mais les grappes, longues cette année, laissent entrevoir des rendements satisfaisants malgré une charge parfois trompeuse.

Stades



29 - Baies à taille de grains de plomb



31 - Baies à taille de pois



33 - Fermeture de la grappe

Baies grains de plomb **BBCH 71/72** à début fermeture de la grappe **BBCH 75/77**
(secteurs les plus précoces)




POINT MÉTÉO

Les températures vont continuer de monter, 20°C pour les minimales matinales et dépasser les 40°C en journée. De légères précipitations sont annoncés en fin de journée de jeudi. A surveiller car certains modèles annoncent des prévisions (très incertaines à ce jour sur les cumuls attendus), et ces averses pourraient revêtir un caractère légèrement orageux.

Attention au risque de forte hygrométrie au matin. La croissance des futures baies est importante et va encore continuer, soyez attentifs à ce point pour décider du renouvellement d'un traitement.

Moyenne / 20ans : **Déficit hydrique des 30 derniers jours : 48%** (-32 mm) **Déficit hydrique des 12 derniers mois : 3%** (-23 mm).





DU CÔTÉ DES MALADIES

Transfert de connaissances

Mildiou

Fiche INRAe, Cliquez ici

Risque

Faible à très faible

TNT au 16/06

St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 3 %

Fréquence : 1 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le vignoble demeure largement sain. Le risque potentiel mildiou est faible à très faible sur la grande majorité du territoire Nord-Aquitaine. Quelques tous petits secteurs à risque fort sont extrêmement réduits et vont disparaître au cours de la semaine à venir. A contrario, les secteurs à risque très faibles vont largement s'agrandir. En absence de précipitation, le modèle n'envisage pas de contamination. (Source BSV – n°12 – Edition Nord Aquitaine - 16/06/2026). Contaminations secondaires possibles mais uniquement en cas de rosées persistantes.

Oïdium

Fiche INRAe, Cliquez ici

Risque

Faible à Moyen

TNT au 16/06

St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

L'avancée de la phénologie nous rapproche petit à petit de la fin de sensibilité des baies de raisin à l'Oïdium. Aucune contamination n'est envisagée par le modèle pour cette semaine. Conditions favorables pour l'entretien de l'Oïdium sur les parcelles contaminées. (Source BSV – n°12 – Edition Nord Aquitaine - 16/06/2026).

Conditions favorables pour l'entretien de l'Oïdium sur les parcelles contaminées.

Black Rot

Fiche INRAe, Cliquez ici

Risque

Fort à Très fort

TNT au 16/06

St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 10 %

Fréquence : 10 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

La plupart des parcelles du vignoble Nord-Aquitaine sont saines. Quelques très rares petits symptômes de Black-Rot sur grappes ont été observés sur parcelles sensibles présentant déjà des symptômes sur feuilles. Le risque potentiel Black-Rot se maintient à un niveau globalement fort à très fort sur le secteur Nord-Aquitaine mais il n'est pas associé à des contaminations. Le modèle n'envisage pas de contamination pour la semaine à venir.

Botrytis

Fiche INRAe, Cliquez ici

Risque

Nul

TNT au 16/06

St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le risque est toujours nul : pas de nouveaux symptômes observés sur feuilles (en général suite blessures, vents, palissage, matériel, etc.), aucun symptôme sur grappes dans notre réseau. Le meilleur anti botrytis reste toujours la prophylaxie.

CONSEILS

Traitement : Même si dernier traitement non lessivé, il est impératif de couvrir la pousse (feuille & baies) :
Toutes les parcelles devront être couvertes avant TOUTES pluies > à 2-3 mm.

L'accompagnement de la pousse et l'accroissement des baies prime toujours sur le lessivage !

Suivant l'état phytosanitaire du vignoble et la vigueur, 2 scénarios possibles :

- Parcelles exemptes de symptômes (ou très faibles) et/ou vigne peu développée : **250-300g** de Cu métal/ha associé à 3-4 Kg de soufre pur.
- Parcelles avec présence régulière de symptômes et/ou vigne très développée : **350-400g** de Cu métal/ha associé à 3-4 Kg de soufre pur.

Si forte présence ou en cas de passif : Oïdium, Black Rot, augmenter la dose de soufre pur à 6-8 Kg, les modèles semble fortement surestimés les risques de ces 2 maladies cette année....

NOTES



Priorités INCHANGÉES !!! Soyez couvert avant prochaines pluies supérieures à 2-3 mm ! Suivre la pousse & accroissement surface de baies ...

La pousse est actuellement importante, **suivre les relevages et les pampres**. Ponctuellement on observe encore quelques symptômes de carences.

Entretien du sol :

Sous le rang :

Priorité : Éviter que les adventices ne gênent la qualité de pulvérisation et suppression !!! Voir bulletins précédents... Profiter du temps de cette semaine pour vous mettre à jour.

Inter-rang : Pratiquer un travail de sol où la protection phytosanitaire est en place et active, pour éviter toute contamination par projection de terre avant une période pluvieuse. Si croûte de battance, remettre en porosité par un griffage superficiel. De plus cela permettra de stimuler la minéralisation du sol et permettra de satisfaire les besoins de la vigne en Azote ([cliquer ici](#)).

Epamprage / Ebourgeonnage :

Surveiller repousses.

Relevages : La quasi totalité des parcelles ont été relevées au moins une fois, deuxième en cours sur les plus vigoureuses, voir rognage direct dans certains cas : chantier prioritaire avant prochaines pluies et prochain traitement.

Rognage : En cours ou déjà fait sur parcelles précoces et/ou vigoureuses. Eviter de se précipiter, attendre afin de limiter la pousse des entrecoeurs (souvent là où entre le mildiou). Sauf urgence, évitez de rogner lors des épisodes de fortes chaleurs (>35°C).

Pour évitez du stress à la vigne et avoir de meilleur débit de chantier/résultats. Pensez à Rogner malin...

Plus d'infos ? Cliquez Ici !

Echaudage : Si parcelle à risque, vu fortes chaleurs annoncées cette semaine et semaine prochaine, il est possible d'utiliser de l'[argile kaolinée calcinée](#) comme barrière physique : 20kg/ha/traitement.



Téléchargez **le point infos** sur la **prophylaxie**





DU CÔTÉ DES INSECTES

Transfert de connaissances

Cicadelle FD Population larvaire en diminution, mais évolution des stades observés : L2(+) L3- (+) L5 (-). Quelques rares captures d'adultes dans les secteurs les plus avancés et à historique (Monbazillac). Privilégiez un épamprage mécanique (élimination d'une partie des oeufs et des larves situées dans l'écorce des ceps). Réseau : Moyenne 1.1 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 8 Diminution. **Prophylaxie** : Toutes les informations en [cliquant ici](#). On voit apparaître les premiers symptômes suspects sur feuilles.

Tordeuses Le vol de G2 est en nette augmentation : Mini : 0 / max : 27 / moy : 7.8 adulte/sem. Pas encore de pontes observées dans notre réseau. A surveiller pour déterminer les dates de traitement si nécessaire. La plupart des glomérules se sont délités avec le grossissement des baies et les pluies. Moyenne glomérules 0 glomérules pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 0. **Surveiller l'évolution du vol et l'apparition des pontes.**

Cicadelles vertes Le vol de G2 se poursuit et est relativement stable. Présence faible de larves observées. Rares dégâts sur feuilles. Réseau : Mini : 0 / max : 23 / moy : 5.3 adulte/sem (stable). Moyenne 1.3 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 5 (diminution). Moyenne 0% Dégâts pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 0.2% (stable).

NOTES

Biodiversité et auxiliaires : Rappels et Détails voir bulletins précédents.

Malgré l'impact des traitements FD obligatoires, on observe une présence régulière des auxiliaires : Punaies, Syrphes (++), chrysopes (adultes, larves et œufs), de très nombreuses araignées, coccinelles (œufs et pupes), acariens prédateurs (*Trombididae*) etc. Présence d'adultes de *Zygina rhamni* avec augmentation des larves et de quelques symptômes sur feuilles sans gravité. De nouvelles sorties de galles phylloxériques sans gravité.

Erinose : Très faible présence cette année, pour l'instant, rares nouveaux symptômes sur feuilles, sans gravité.

Enherbement : 2 questions à se poser avant de sortir le gyrobroyeur : 1) Est-ce que le couvert gêne la qualité de pulvérisation ? 2) Est-ce que le couvert maintien une hygrométrie favorable à la maladie ? – Si vous répondez « Non » à ces 2 questions = Pas de tonte !!!

CONSEILS

CFD : UNIQUEMENT pour la Dordogne et Lot & Garonne : Zone à 3-2+1/0 : Troisième traitement à réaliser avant le 25 juin. Autres scénarios : Trmt Terminé. Tous les textes officiels de la DRAAF : [Cliquez Ici](#). **RAPPEL** : Les messages des GDON pour traitement **ALDUTICIDES NE CONCERNENT PAS** les utilisateurs de **Pyrèthres naturel**.

Eudémis : Attente ponte G2, A surveiller ! Il semble trop tôt pour commencer traitement, en l'absence de pontes.

Cicadelle verte : Le vol de G2 se confirme, possibilité de réaliser un traitement insectifuge si nécessaire. (purins de fougères à 10 % ou barrière physique [plus d'infos cliquez ici](#))

NOTE : L'utilisation d'une barrière physique de type argile kaolinée calcinée, en plus de l'effet insectifuge, atténuera les dégâts dus à l'échaudage physiologique (voir p 2). Elle pourra aussi avoir un effet sur les tordeuses dans leur reconnaissance des sites de pontes (baies). Privilégier une application en plein et non centrée sur grappe pour une meilleure efficacité.

↓ En images...



Phytotoxicité soufre



Echaudage



Ooplaque de punaise



Cercopie parasité



Larve de cicadelle pruneuse



Papillon eudémis



Coccinelle



Juvénile punaise diabolique
! Signalez sa présence !



Acarien prédateur
Trombididae



Araignée en plein repas

Relevé météo, par secteur

	Du 09 juin au 16 juin					
	Températures (°C)			Précipitations (mm)		
	mini.	max.	Moyen.	mini.	max.	Cumul
Bergerac	8,6	35	20,9	0	1	1,7
Villefranche de Lonchat	6,8	33,6	19,6	0	0,9	1,4
Montcaret	7	34	19,8	0	0,3	0,5
Pineuilh	9,6	33,6	20,4	0	0,3	0,3
Saint Astier (47)	7,6	33,4	20,1	0	0,4	0,4
Sigoulès	8,2	33,2	19,8	0	0,5	0,6
Saint Jean de Duras (47)	7,8	33,4	20,4	0	0,5	0,5
Creysensac & Pissot	9,4	33	20,2	0	1,2	1,3

Prévisions météo à une semaine, par secteur

Précipitations en mm

0

< 4

< 15

> 15

Prévisions semaine à venir	Mer 17.06			Jeu 18.06			Ven 19.06			Sam 20.06			Dim 21.06			Lundi 22.06		
	Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations		
	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)
Bergerac	20	35	-	17	30	0,2	18	36	-	19	36	-	19	41	-	21	42	-
Villefranche de Lonchat	18	35	-	18	38	-	19	36	-	18	35	-	21	41	-	22	43	-
Montcaret	18	35	-	18	38	-	20	36	-	18	34	-	20	40	-	22	43	-
Pineuilh	19	35	-	18	39	-	19	36	-	18	35	-	20	41	-	22	42	-
Saint Astier	18	35	-	21	39	0,2	20	36	-	19	35	-	20	40	-	21	42	-
Sigoulès	19	35	-	20	38	0,1	20	35	-	18	35	-	19	41	-	21	41	-
Saint Jean de Duras	19	35	-	21	39	0,2	20	36	-	19	35	-	20	40	-	21	41	-
Creysensac & Pissot	20	34	-	20	38	-	19	35	-	18	35	-	19	40	-	21	42	-



POUR ALLER PLUS LOIN...

Les informations ci-dessous ne sont valables que dans le respect des bonnes pratiques agronomiques et biologiques respectueuses du sol et de la plante, en intégrant autant que possible l'approche globale de son vignoble.

Préparations de phytothérapie et/ou biodynamie à utiliser actuellement

📄 Téléchargez [l'article phytothérapie](#) et cliquez sur lien (en vert) pour les [fiches par plante](#), ou demandez-les à vos techniciens

[Ortie](#) [Prêle](#) [Reine des prés](#) [Valériane](#) [Pissenlit](#) [Sauge](#) [Voir Bulletins Précédents](#)
(stress – rognage-éffeillage)

Camomille

En Tisane à 10%, on utilise les fleurs seulement. Riche en Soufre, Calcium & Potassium. A un Rôle de régulation, en préventif et en accompagnement de la vigne pour de nombreuses maladies (notamment Mildiou). **Intéressant pour « humidifier » la vigne, notamment parcelle sensible échaudage (idem tisane Ortie).** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

Fougères

En Purin à 10 %, Préférez la Fougère Aigle (*Pteridium aquilinum*), à défaut la Fougère Mâle (*Dryopteris filixmas*). Action Insectifuge. Est utile contre les cicadelles vertes à conditions de renouveler vos traitements tous les 8-10 jours maximum, sinon pas d'efficacité. Ce sont les feuilles (frondes) que l'on prépare en purin. (1Kg de feuilles fraîches ou 100 g de sèches dans 10 litres d'eau).

Consoude

En Purin ou « pur jus », permet d'aider les plantes en situation de stress, aide à la fructification, permettrait de réduire les doses de soufre. Plante riche en fer, bore et potasse. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures. Intéressant aussi si rognage ou éffeillage.**

Achillée

En Tisane (10%), on utilise la plante entière, Riche en Soufre, Sucre & Potasse. Aide à lutter contre la coulure & favorise la floraison. Contient également des huiles volatiles & de l'acide Salicylique, qui permettraient la réduction des doses de Soufre. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

501

Possible d'utiliser la 501, entre 2 & 4g/ha. Suivant la météo à venir, une ou plusieurs applications peuvent être envisagées après la Fleur, notamment pour renforcer la plante et stimuler ses défenses suite aux conditions météo (forte amplitude thermique, manque de luminosité et de chaleur, présence de maladies et notamment Mildiou). Possibilité d'ajouter quelques gouttes de valériane (507), en début de dynamisation, sauf si forte présence de mildiou. **A ne pas trop utiliser par temps lumineux et sec. Ne pas utiliser sur des vignes chétives.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#). **Contactez-nous si questions.**



LA POSITION DE LA LUNE

Prendre en compte la position de la lune dans mes travaux :

Lune montante jusqu'au **12/07**
et **descendante** jusqu'au **28/06**

Lune croissante jusqu'au **30/06**
et **décroissante** jusqu'au **14/07**

Pour repousse plus lente tondre les couverts en jours fleurs ou racines :
Lune descendante : 16-17 juin, 21-26 juin



Période favorable aux préparations préventives des **maladies** **30/06 au 04/07**



Période favorable aux préparations préventives des **insectes** **02-03/07**



Période favorable limitant les germinations des **adventices** : **travail sous le rang** **21 (après-midi) au 24 juin**



Prochains **nœuds lunaires** **19/06 à 20h**



Prochain **périgée** **13/07 à 10h**

Éviter le travail des sols et de la plante pendant les nœuds lunaires (2 par mois) et la Lune en périgée (1 par mois).

N'hésitez pas à contacter votre technicien.ne-conseil pour toute information complémentaire.

CALENDRIER BIODYNAMIQUE ↓

Dates	Mer 17/06	Jeudi 18/06	Ven 19/06	Sam 20/06	Dim 21/06	Lun 22/06	Mar 23/07	
Jour								
Dessous rang								Jour fruit
Inter rang								Jour racine
Tonte couvert								Jour fleur
Epamprage-Effeillage-Rognage								Jour feuille

Le soleil est dans la constellation du Taureau et y restera jusqu'au 20/06 où il entrera dans celle des Gémeaux.


Cueillette des plantes pour tisanes et préparations biodynamiques : se réalise au stade tout début floraison de la plante, le matin, par très beau temps en évitant les jours feuilles et le périgée et en favorisant les jours fleurs et l'apogée. Évitez aussi les bords de route très fréquentés ou trop pollués par l'activité humaine ou agricole. Pour les plantes à faire sécher, préférez la lune décroissante ET montante.

Note concernant la biodynamie : il faut d'abord respecter et maîtriser les règles de l'agronomie, de l'agriculture biologique et seulement ensuite la biodynamie peut apporter un plus à votre domaine et à vos vins. C'est pourquoi nous conseillons de se concentrer sur les fondamentaux cette année, le temps d'acquiescer tout le matériel nécessaire et de mettre les vignes au propre, une fois cela fait on pourra envisager une évolution sereine vers la biodynamie.

📄 Plus d'infos sur [la mise en œuvre de la biodynamie](#)

📄 Plus d'infos sur [l'approche du sol en biodynamie](#)

← [Retour au sommaire](#)



Intensité d'attaque par la Pourriture grise selon les pratiques d'effeuillage (Colombar, 1997, étude IFV)

Les Effeuillages permettent une meilleure aération de la zone des grappes, baisse de l'hygrométrie favorable aux maladies, ils doivent aussi permettre de laisser passer la lumière, sans mettre les grappes à nues ; Ils permettront également à vos traitements de mieux pénétrer la zone fructifère. Plus ils sont faits tôt, moins vous blessez les baies et meilleure sera leur efficacité.

Les points à prendre en compte avant d'effeuiller :

- Les parcelles les plus sujettes aux maladies fongiques devront être soigneusement effeuillées.
- Les cépages les plus sensibles aux coups de soleil et aux coups de chaud devront être effeuillés plus rapidement ou partiellement.

Evitez d'effeuiller les faces exposées au soleil de l'après-midi.

Diamètre baies (mm)	Augmentation de la surface (fois)
1	-
2	x 4
3	x 9
4	x 16
5	x 25
6	x 36
7	x 49
8	x 64
9	x 81
10	x 100




Importance d'accompagner la pousse : de la chute des capuchons floraux au stade fermeture de la grappe : la surface est 25 fois supérieure entre une baie de 1 mm et 5 mm : voir tableau ci-dessus).

Source : Bulletin technique FIBL & Bulletin CAB Pays de la Loire, saison 2023.

Rappel sur les délais d'incubation : Graphique représentant la durée d'incubation du mildiou en fonction de la température :

ATTENTION aux données sur feuilles !!
Les délais d'INCUBATION sur inflorescences ou baies sont plus longs, généralement....



Source BSV : Les données pour réaliser ce graphique sont issues du livre « Maladies cryptogamiques de la vigne : champignons parasites des organes herbacés et du bois de la vigne », Dubos B, 1999, eds Féret, Bordeaux.



FOCUS TECHNIQUE

Point Flavescence Dorée :

Détail des dates de traitement publiées par le GDON, Bulletin N°1, mai 2026 :

Dates retenues dans le cas de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique

Attention : le piégeage ne s'applique pas aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique : ces derniers, effectuent sur leurs parcelles de vignes :

- Sur les zones ou communes à 3, 2+1/0 ou 2 traitements : 3 larvicides
- Sur les zones ou communes à 1+1/0 traitements : 2 larvicides
- Sur les zones ou communes à 1 traitement : 1 larvicide

Sur les parcelles contaminées en 2025, traitées aux de produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique : 3 traitements obligatoires doivent être appliqués quel que soit le nombre de traitement obligatoire sur la commune.

CLASSEMENT DES COMMUNES	3 TRAITEMENTS	2 + 1/0 TRAITEMENTS (PIÉGEAGE)	2 TRAITEMENTS	1+1/0 TRAITEMENTS (PIÉGEAGE)	1 TRAITEMENT
Nombre de traitement obligatoires à réaliser avec des produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture Biologique	3 TRAITEMENTS			2 TRAITEMENTS	1 TRAITEMENT
T 1 Larvicide	Du 18 au 31 mai	Du 18 au 31 mai	Du 18 au 31 mai	Du 18 au 31 mai	Du 1 au 7 juin
T 2 Larvicide	8 à 10 jours après le 1er traitement	8 à 10 jours après le 1er traitement	8 à 10 jours après le 1er traitement	8 à 10 jours après le 1er traitement	PAS DE T2
T 3 Larvicide	8 à 10 jours après le 2ème traitement	8 à 10 jours après le 2ème traitement	8 à 10 jours après le 2ème traitement	PAS DE T3	PAS DE T3

Pour plus de précisions sur les communes, les sections et les parcelles particulières, se référer à la liste envoyée par le GDON.



HISTORIQUE – RÉSEAU DE SURVEILLANCE


Données issues du réseau de piégeage et de surveillance d'AgroBio Périgord

Données mises à jour le : 16/06/2026


11 Participants, 21 pièges en 2026

Graphiques synthétisant les principales données de 2026 :

Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Eudémis



Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Cicadelles Vertes



NOUS CONTACTER



Coordination du pôle
Cépages résistants ·
RESAQ Vitibio & RESAQ
Ferti ·

coordoviticulture@
agrobioperigord.fr
06 07 72 54 36



Réseau de surveillance ·
Conseil et formations
tailles-greffage-curetage
· Réseau DEPHY-
ECOPHYTO ·

c.maisonneuve@
agrobioperigord.fr
07 88 02 29 38



Conseil et formations bio
biodynamiques ·
Coordination
expérimentations ·
Réfèrent viticulture
biologique pour la FNAB
et l'ITAB ·

e.maille@
agrobioperigord.fr
06 87 58 48 50

NOS PARTENAIRES RÉSEAU



NOS RÉSEAUX SOCIAUX

 [YouTube](#)

 [Groupe Facebook Viti
AgroBio Périgord](#)

Parce que...

- ✓ Je soutiens **une agriculture bio et locale en Dordogne**
- ✓ Je veux faire partie d'un réseau de **plus de 650 adhérents**
- ✓ Mon adhésion est **essentielle** pour la vie du réseau et permet de **peser sur les politiques publiques** liées à la bio (aides...)

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION

 L'adhésion en ligne en 5 min, c'est **par ici** !



• **AGROBIO PÉRIGORD** •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

Ou télécharger le
bulletin d'adhésion
papier

Note : sur présentation de votre justificatif d'adhésion, VBNA (Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine) applique une remise de 40 € à votre cotisation !

**Nouvelle
ADRESSE**

AgroBio Périgord
Pôle Pomport (viticulture)
Route du Lac
24240 POMPORT

Nous partageons les locaux avec les
Vignerons Indépendants de Dordogne

Cette action est réalisée grâce à nos adhérents.

Avec le soutien financier de :

