



• AGROBIO PÉRIGORD •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

→ **Mardi 23 juin 2026**

Viticulture bio

BULLETIN TECHNIQUE N°08

PROCHAIN BULLETIN :
Mardi 30 juin

Du côté
des maladies

P 2

Du côté
des insectes

P 3

Pour aller plus loin...
La position de la Lune

P 5

Focus
Météo

P 4

Focus
technique

P 6

Historique
Réseau de surveillance

P 8



Événements à venir

SAVE THE DATE Mercredi 01 juillet : Après-midi autour des nouvelles variétés résistantes aux maladies, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de Dordogne. Toutes les infos dans l'email.

OBSERVATIONS

La semaine a été marquée par des températures caniculaires, sans précipitations significatives (sauf 3 mm à Montcaret).

Les stades phénologiques progressent rapidement et se resserrent : le stade moyen est plutôt début fermeture de la grappe, mais plus de 50 % des parcelles ont déjà atteint BBCH 79 (fermeture de la grappe). La parcelle la plus tardive reste à BBCH 75 (grains 3-4 mm).

Une hétérogénéité intra-parcellaire persiste, avec des phénomènes de coulure (notamment sur Merlot), d'ampleur variable, mais présente. Les grappes, longues cette année, conservent un nombre de baies suffisant pour des rendements satisfaisants.

Stades



31 - Baies à taille de pois



33 - Fermeture de la grappe

Stades observés : Fin baies grains de pois **BBCH 75** à fermeture de la grappe **BBCH 79**




POINT MÉTÉO

Les températures de cette prochaine semaine vont restées à des niveaux historiquement jamais atteints, tant la journée que la nuit, avec des températures moyennes journalières entre 26 et 29°C.

Plusieurs modèles météo annoncent une baisse des températures à compter de cette fin de semaine, sous un ciel plutôt nuageux. Des orages et des averses sont possibles, avec des cumuls de précipitations dès samedi en fin d'après-midi, estimé entre 0 et 20 mm.

Les probabilités de précipitations sont à ce jour, inférieur à 35%. Restez vigilant.

Moyenne / 20ans : Déficit hydrique des 30 derniers jours : **63%** (-49 mm) Déficit hydrique des 12 derniers mois : **7 %** (-52 mm).





DU CÔTÉ DES MALADIES

Transfert de connaissances

Mildiou

Fiche INRAE, Cliquez ici

Risque

Faible à très faible

TNT au 23/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 1 %

Fréquence : 1 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Légère extension des symptômes sur des parcelles déjà contaminées et principalement sur des parcelles TNT. Les symptômes sur feuilles et sur grappes ne sont pas sporulants ou rarement et légèrement. Des symptômes de rot brun sont observés, généralement par extension, via les rafles, des symptômes déjà présents sur grappes. Le vignoble demeure sain. Sous les prévisions actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination. (Source BSV – n°13 – Edition Nord Aquitaine – 23/06/2026).

Oïdium

Fiche INRAE, Cliquez ici

Risque

Faible à Moyen

TNT au 23/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Les symptômes observés restent extrêmement rares sur le vignoble. L'avancée de la phénologie nous rapproche petit à petit de la fin de sensibilité des baies de raisin à l'Oïdium. Le risque potentiel oïdium est en augmentation. La fin de grande de sensibilité des grappes est proche ou atteinte pour la majorité des parcelles (stade L33/Fermeture de la grappe). Sous les prévisions actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination. Conditions favorables pour l'entretien de l'Oïdium sur les parcelles contaminées. (Source BSV – n°13 – Edition Nord Aquitaine – 23/06/2026).

Black Rot

Fiche INRAE, Cliquez ici

Risque

Fort à Très fort

TNT au 23/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 5 %

Fréquence : 10 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le vignoble reste très sain et la situation n'évolue pas. Sous les prévisions actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination. Pas de contamination envisagée. Le modèle reflète principalement le comportement du Black-Rot sur des parcelles sensibles. La gestion de la protection sanitaire doit prendre en compte l'historique de sensibilité parcellaire. (Source BSV – n°13 – Edition Nord Aquitaine – 23/06/2026)

Botrytis

Fiche INRAE, Cliquez ici

Risque

Nul

TNT au 23/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le risque est toujours nul : pas de nouveaux symptômes observés sur feuilles (en général suite blessures, vents, palissage, matériel, etc.), aucun symptôme sur grappes dans notre réseau. Le meilleur anti botrytis reste toujours la prophylaxie.

CONSEILS

Traitement : Même si dernier traitement non lessivé, il est impératif de couvrir la pousse (feuille & baies) :
Toutes les parcelles devront être couvertes avant TOUTES pluies > à 2-3 mm.

L'accompagnement de la pousse et l'accroissement des baies prime toujours sur le lessivage ! En cas de traitement privilégiez de grosses gouttes pour éviter l'évaporation avant d'avoir atteint le feuillage.

Suivant l'état phytosanitaire du vignoble et la vigueur, 2 scénarios possibles :

- Parcelles exemptes de symptômes (ou très faibles) et/ou vigne peu développée : **250-300g** de Cu métal/ha associé à 3-4 Kg de soufre pur.
- Parcelles avec présence régulière de symptômes et/ou vigne très développée : **350-400g** de Cu métal/ha associé à 3-4 Kg de soufre pur.

Si forte présence ou en cas de passif : Oïdium, Black Rot, augmenter la dose de soufre pur à 6-8 Kg, les modèles semblent fortement surestimés les risques de ces 2 maladies cette année....

NOTES



Priorités INCHANGÉES !!! Soyez couvert avant prochaines pluies supérieures à 2-3 mm ! Suivre la pousse & accroissement surface de baies ...

Entretien du sol :

Sous le rang :

Priorité : Éviter que les adventices ne gênent la qualité de pulvérisation et suppression !!! Voir bulletins précédents... Profiter du temps de cette semaine pour vous mettre à jour.

Inter-rang : Pratiquer un travail de sol où la protection phytosanitaire est en place et active, pour éviter toute contamination par projection de terre avant une période pluvieuse.

Si croûte de battance, remettre en porosité par un griffage superficiel. De plus cela permettra de stimuler la minéralisation du sol et permettra de satisfaire les besoins de la vigne en Azote ([cliquer ici](#)).

Epamprage / Ebourgeonnage :

Surveiller repousses.

Relevages : La quasi totalité des parcelles ont été relevées au moins une fois, deuxième en cours sur les plus vigoureuses, voir rognage direct dans certains cas : chantier prioritaire avant prochaines pluies et prochain traitement.

Rognage : En cours ou déjà fait sur parcelles précoces et/ou vigoureuses. Eviter de se précipiter, attendre afin de limiter la pousse des entrecoeurs (souvent là où entre le mildiou). Sauf urgence, évitez de rogner lors des épisodes de fortes chaleurs (>35°C).

Pour évitez du stress à la vigne et avoir de meilleur débit de chantier/résultats. Pensez à Rogner malin...

Plus d'infos ? Cliquez Ici !

Echaudage : Vu les fortes chaleurs annoncées cette semaine et semaine prochaine, il est possible d'utiliser de l'argile kaolinite calcinée ou de l'hydroxyde de calcium comme barrière physique. Dosage : 15-20kg/ha pour 200 à 250L/ha de bouillie = 5-7%. Privilégiez les grosses gouttes pour éviter leur évaporation avant d'avoir atteint le feuillage. Privilégier les faces Ouest et Sud. [Carte des distributeurs](#) en Dordogne et limitrophes.



Téléchargez **le point infos** sur la prophylaxie





DU CÔTÉ DES INSECTES

Transfert de connaissances

- Cicadelle FD** Les stades larvaires observés sont de plus en plus avancés et en nette diminution: L5 (-). Quelques rares captures d'adultes sur le réseau. Rognez en dernier les parcelles présentant des symptômes ou ayant eu des pieds infectés détectés l'an dernier par la prospection. Réseau : Moyenne 0.1 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 1 Diminution. **Prophylaxie** : Toutes les informations en [cliquant ici](#). On voit apparaître les premiers symptômes. Ne supprimez pas les organes porteurs de symptômes pour ne pas gêner la prospection ! (cela n'empêchera pas les contaminations).
- Tordeuses** Le vol de G2 se poursuit : Mini : 0 / max : 19 / moy : 4.9 adulte/sem Diminution. Les premières pontes ont été observées dans notre réseau (stade frais + / jaune + / écloses -). A surveiller pour déterminer les dates de traitement si nécessaire. Seuil de déclenchement à 5 pontes pour 100 grappes et au plus proche des stades tête noire. Avec les fortes températures, les stades évolueront vite, mais on a aussi dessèchement de certaines pontes. Moyenne pontes 1.5 pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 6. **Quelques perforations isolées à la marge** : Moyenne perfos 0.4 pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 2.
- Cicadelles vertes** Le vol de G2 se poursuit. Présence faible de larves observées. Rares dégâts sur feuilles. Réseau : Mini : 0 / max : 13 / moy : 4.9 adulte/sem (Diminution). Moyenne 2.4 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 12 (Augmentation). Moyenne 0% Dégâts pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 0% (stable). possibilité de réaliser un traitement insectifuge si historique (purins de fougères à 10 % ou barrière physique [plus d'infos cliquez ici](#).)

NOTES

Biodiversité et auxiliaires : Rappels et Détails voir bulletins précédents.

La canicule à un fort impact sur la vie à la vigne. On constate actuellement une activité très réduite tant des ravageurs que des auxiliaires. On constate toujours la présence de certains auxiliaires tels que les araignées, les punaises (dont [diabolique](#)), quelques syrphes et coccinelles... On peut aussi observer des papillons. Baisse de la présence des larves de *Zygina rhamni*, mais on trouve plus régulièrement des traces de ses dégâts sur feuilles qui restent négligeables.

Erinose : Très faible présence cette année, pour l'instant, rares nouveaux symptômes sur feuilles, sans gravité.

Enherbement : 2 questions à se poser avant de sortir le gyrobroyeur : 1) Est-ce que le couvert gêne la qualité de pulvérisation ? 2) Est-ce que le couvert maintien une hygrométrie favorable à la maladie ? - Si vous répondez « Non » à ces 2 questions = Pas de tonte !!! Vu la météo actuelle, laissez les couverts à paille, ne surtout pas les tondre si possible ou alors à au moins 8-10 cm

CONSEILS

CFD : UNIQUEMENT pour la Dordogne et Lot & Garonne : Zone à 3-2+1/0 : Troisième traitement à réaliser avant le 25 juin. Autres scénarios : Trmt Terminé. Tous les textes officiels de la DRAAF : [Cliquez ici](#). **RAPPEL** : Les messages des GDON pour traitement **ALDUTICIDES NE CONCERNENT PAS** les utilisateurs de **Pyrèthres naturel**.

Eudémis : Premières pontes de G2, A surveiller ! Le nombre de pontes est actuellement trop faible pour justifier un traitement dans la plupart des cas.. Attention car la pression eudémis est très ponctuelle : observez sur VOS parcelles !

NOTE : L'utilisation d'une barrière physique de type argile kaolinite calcinée, en plus de l'effet insectifuge, atténuera les dégâts dus à l'échaudage physiologique (voir p 2). Elle pourra aussi avoir un effet sur les tordeuses dans leur reconnaissance des sites de pontes (baies). Privilégier une application en plein et non centrée sur grappe pour une meilleure efficacité.

↓ En images...




Début symptômes FD



Début symptômes FD



Esca/BDA (maladie du bois)



Arrêt de croissance : Dessèchement de l'Apex



Dégâts de cicadelle verte sur feuille (cépage rouge)




Araignée en chasse




Punaise diabolique adulte



Exuvie de L5 (cicadelle de la FD)



Perforation eudémis G2



Ponte tordeuse (a priori Eudémis), Stade Eclos

Relevé météo, par secteur

	Du 23 juin au 23 juin					
	Températures (°C)			Précipitations (mm)		
	mini.	max.	Moyen.	mini.	max.	Cumul.
Bergerac	16,4	41,8	27,9	0	0	0
Villefranche de Lonchat	13,8	40	26,6	0	0	0
Montcaret	14	39,6	26,3	0	3	3,6
Pineuilh	16	40	27,4	0	0,9	0,9
Saint Astier (47)	15	39,4	26,9	0	0,1	0,1
Sigoulès	15,4	38,8	26,6	0	0,1	0,1
Saint Jean de Duras (47)	15,8	39,6	26,8	0	0,7	0,7
Creysensac & Pissot	16,8	40	27,9	0	0,3	0,3

Prévisions météo à une semaine, par secteur

Précipitations en mm

0

< 4

< 15

> 15

Prévisions semaine à venir	Mer 24.06			Jeu 25.06			Ven 26.06			Sam 27.06			Dim 28.06			Lundi 29.06		
	Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations		
	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)
Bergerac	28	42	-	22	40	-	20	36	-	23	36	-	17	33	1,8	17	36	3
Villefranche de Lonchat	28	41	0,2	24	40	-	20	35	-	22	35	-	18	33	2,4	17	37	2,4
Montcaret	25	42	-	25	38	-	21	34	0,3	22	37	-	17	34	0,9	17	39	0,3
Pineuilh	29	42	-	24	40	-	20	35	-	23	35	-	17	33	1,8	17	30	2,7
Saint Astier	27	42	-	25	40	-	20	35	-	24	35	-	17	33	2,1	17	36	3
Sigoulès	25	42	-	25	39	0,2	21	35	-	23	38	-	17	34	0,9	17	39	0,3
Saint Jean de Duras	26	42	-	26	39	-	21	35	-	23	38	-	17	34	0,9	17	39	0,9
Creysensac & Pissot	29	41	0,1	24	39	-	19	35	-	23	35	-	17	32	3,6	17	37	0,9



POUR ALLER PLUS LOIN...

Les informations ci-dessous ne sont valables que dans le respect des bonnes pratiques agronomiques et biologiques respectueuses du sol et de la plante, en intégrant autant que possible l'approche globale de son vignoble.

Préparations de phytothérapie et/ou biodynamie à utiliser actuellement

📄 Téléchargez [l'article phytothérapie](#) et cliquez sur lien (en vert) pour les [fiches par plante](#), ou demandez-les à vos techniciens

[Ortie](#) [Prêle](#) [Reine des prés](#) [Valériane](#) [Pissenlit](#) [Sauge](#) [Voir Bulletins Précédents](#)
(stress – rognage-éffeuilage)

Camomille

En Tisane à 10%, on utilise les fleurs seulement. Riche en Soufre, Calcium & Potassium. A un Rôle de régulation, en préventif et en accompagnement de la vigne pour de nombreuses maladies (notamment Mildiou). **Intéressant pour « humidifier » la vigne, notamment parcelle sensible échaudage (idem tisane Ortie).** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

Fougères

En Purin à 10 %, Préférez la Fougère Aigle (*Pteridium aquilinum*), à défaut la Fougère Mâle (*Dryopteris filixmas*). Action Insectifuge. Est utile contre les cicadelles vertes à conditions de renouveler vos traitements tous les 8-10 jours maximum, sinon pas d'efficacité. Ce sont les feuilles (frondes) que l'on prépare en purin. (1Kg de feuilles fraîches ou 100 g de sèches dans 10 litres d'eau).

Consoude

En Purin ou « pur jus », permet d'aider les plantes en situation de stress, aide à la fructification, permettrait de réduire les doses de soufre. Plante riche en fer, bore et potasse. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures. Intéressant aussi si rognage ou éffeuilage.**

Achillée

En Tisane (10%), on utilise la plante entière, Riche en Soufre, Sucre & Potasse. Aide à lutter contre la coulure & favorise la floraison. Contient également des huiles volatiles & de l'acide Salicylique, qui permettraient la réduction des doses de Soufre. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

501

Possible d'utiliser la 501, entre 2 & 4g/ha. Suivant la météo à venir, une ou plusieurs applications peuvent être envisagées après la Fleur, notamment pour renforcer la plante et stimuler ses défenses suite aux conditions météo (forte amplitude thermique, manque de luminosité et de chaleur, présence de maladies et notamment Mildiou). Possibilité d'ajouter quelques gouttes de valériane (507), en début de dynamisation, sauf si forte présence de mildiou. **A ne pas trop utiliser par temps lumineux et sec. Ne pas utiliser sur des vignes chétives.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#). **Contactez-nous si questions.**



LA POSITION DE LA LUNE

Prendre en compte la position de la lune dans mes travaux :

Lune montante jusqu'au **12/07**
et **descendante** jusqu'au **28/06**

Lune croissante jusqu'au **30/06**
et **décroissante** jusqu'au **14/07**

Pour repousse plus lente tondre les couverts en jours fleurs ou racines en :

Lune descendante : 24-26 juin



Période favorable aux préparations préventives des **maladies** **30/06 au 03/07**



Période favorable aux préparations préventives des **insectes** **02-03/07**



Période favorable limitant les germinations des **adventices** : **travail sous le rang** **24 juin & 02-03 juillet**



Prochains **nœuds lunaires** **04/07 à 10h**



Prochain **périgée** **13/07 à 10h**

Éviter le travail des sols et de la plante pendant les nœuds lunaires (2 par mois) et la Lune en périgée (1 par mois).

N'hésitez pas à contacter votre technicien.ne-conseil pour toute information complémentaire.

CALENDRIER BIODYNAMIQUE ↓

Dates	Mer 24/06	Jeudi 25/06	Ven 26/06	Sam 27/06	Dim 28/06	Lun 29/06	Mar 30/07	
Jour								
Dessous rang								Jour fruit
Inter rang								Jour racine
Tonte couvert								Jour fleur
Epamprage-Effeuilage-Rognage								Jour feuille

Très favorable
↓
Très défavorable

Le soleil est dans la constellation des Gémeaux et y restera jusqu'au 19/07 où il entrera dans celle du Cancer.


Cueillette des plantes pour tisanes et préparations biodynamiques : se réalise au stade tout début floraison de la plante, le matin, par très beau temps en évitant les jours feuilles et le périgée et en favorisant les jours fleurs et l'apogée. Évitez aussi les bords de route très fréquentés ou trop pollués par l'activité humaine ou agricole. Pour les plantes à faire sécher, préférez la lune décroissante ET montante.

📄 Plus d'infos sur [la mise en œuvre de la biodynamie](#)

📄 Plus d'infos sur [l'approche du sol en biodynamie](#)

← [Retour au sommaire](#)

Note concernant la biodynamie : il faut d'abord respecter et maîtriser les règles de l'agronomie, de l'agriculture biologique et seulement ensuite la biodynamie peut apporter un plus à votre domaine et à vos vins. C'est pourquoi nous conseillons de se concentrer sur les fondamentaux cette année, le temps d'acquiescer tout le matériel nécessaire et de mettre les vignes au propre, une fois cela fait on pourra envisager une évolution sereine vers la biodynamie.



Intensité d'attaque par la Pourriture grise selon les pratiques d'effeuillage (Colombar, 1997, étude IFV)

Les Effeuillages permettent une meilleure aération de la zone des grappes, baisse de l'hygrométrie favorable aux maladies, ils doivent aussi permettre de laisser passer la lumière, sans mettre les grappes à nues ; Ils permettront également à vos traitements de mieux pénétrer la zone fructifère. Plus ils sont faits tôt, moins vous blessez les baies et meilleure sera leur efficacité.

Les points à prendre en compte avant d'effeuiller :

- Les parcelles les plus sujettes aux maladies fongiques devront être soigneusement effeuillées.
- Les cépages les plus sensibles aux coups de soleil et aux coups de chaud devront être effeuillés plus rapidement ou partiellement.

Evitez d'effeuiller les faces exposées au soleil de l'après-midi.

Diamètre baies (mm)	Augmentation de la surface (fois)
1	-
2	x 4
3	x 9
4	x 16
5	x 25
6	x 36
7	x 49
8	x 64
9	x 81
10	x 100




Importance d'accompagner la pousse : de la chute des capuchons floraux au stade fermeture de la grappe : la surface est 25 fois supérieure entre une baie de 1 mm et 5 mm : voir tableau ci-dessus).

Source : Bulletin technique FIBL & Bulletin CAB Pays de la Loire, saison 2023.

Rappel sur les délais d'incubation : Graphique représentant la durée d'incubation du mildiou en fonction de la température :

ATTENTION aux données sur feuilles !!
Les délais d'INCUBATION sur inflorescences ou baies sont plus longs, généralement....



Source BSV : Les données pour réaliser ce graphique sont issues du livre « Maladies cryptogamiques de la vigne : champignons parasites des organes herbacés et du bois de la vigne », Dubos B, 1999, eds Féret, Bordeaux.



FOCUS TECHNIQUE

Point Flavescence Dorée :

Infos prospection publiées par le GDON, Bulletin N°2, juin 2026 :

PROSPECTION

La prospection du vignoble : son importance dans la lutte contre la Flavescence dorée est majeure, à plusieurs titres :

- Elle permet de repérer les pieds extériorisant des symptômes et de les arracher de manière à supprimer le réservoir de phytoplasme (micro-organisme responsable de la maladie). Ainsi la progression de la maladie est fortement limitée ;
- La prospection collective permet aussi de surveiller la progression de la maladie sur le territoire, d'adapter la lutte, et d'éviter l'apparition de foyers important nécessitant l'arrachage de parcelles entières ;
- La prospection collective réalisée par le GDON est aussi la seule prise en compte par l'administration pour faire évoluer le périmètre de la zone délimitée et de faire diminuer le nombre de traitements par commune. De plus elle est obligatoire pour les communes où le scénario alternatif est mis en place.

Cette année la prospection sera réalisée par des techniciens en quad et un groupe de techniciens à pied sur les communes suivantes :

BERGERAC	RAZAC-D'EYMET
CARSAC-DE-GURSON	RIBAGNAC
COLOMBIER	ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES
CONNÉ-DE-LABARDE	SADILLAC
CREYSSE ⁽¹⁾	SAINT-AUBIN-DE-CADELECH
FOUGUEYROLLES	SAINT-AUBIN-DE-CADELECH
LAMONZIE-SAINT-MARTIN	SAINT-CAPRAISE-D'EYMET
LEMBRAS	SAINT-CYPRIEN
MESCOULES	SAINT-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE
MONBAZILLAC	SAINT-SEURIN-DE-PRATS section cadastrale B
MONESTIER	SAINT-VIVIEN
MONTAZEAU	SAUSSIGNAC
MONTPEYROUX	SIGOULES-ET-FLAUGEAC
NASTRINGUES	THENAC
PORT-SAINT-FOY-ET-PONCHAPT ⁽²⁾	VELINES
PRIGONRIEUX	VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT
RAZAC-DE-SAUSSIGNAC	

Légende :

(1) sections cadastrales AV, AD, AE, AA, AC0002, AC0003, AC0016, AC0017

(2) sections cadastrales AH, ZB, AE, AT, AV, AO0007 à AO0011, AO0137, AM0030 à 0035 et 0040, 0094 à 0100

DURAS
LOUBES-BERNAC
SAINT-ASTIER
SOUSENSAC
SAUVETAT-DU-DROPT

La prospection sera réalisée à partir de début août 2026. Vous serez amenés à rencontrer les prospecteurs dans vos vignes durant cette période. Merci de leur réserver le meilleur accueil, comme à votre habitude !

Saison 2026 - GDON DU BERGERACOIS Pôle Viticole ZA Vallade Sud 24112 BERGERAC Cedex

Pour plus de précisions, contactez Cathy Lourtet : 05 53 24 55 44 ou 06 84 80 54 49 - cathy.lourtet@fvbd.fr.



HISTORIQUE – RÉSEAU DE SURVEILLANCE


Données issues du réseau de piégeage et de surveillance d'AgroBio Périgord

Données mises à jour le : 23/06/2026


11 Participants, 21 pièges en 2026

Graphiques synthétisant les principales données de 2026 :

Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Eudémis



Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Cicadelles Vertes



NOUS CONTACTER



Coordination du pôle
Cépages résistants ·
RESAQ Vitibio & RESAQ
Ferti ·

coordoviticulture@
agrobioperigord.fr
06 07 72 54 36



Réseau de surveillance ·
Conseil et formations
tailles-greffage-curetage
· Réseau DEPHY-
ECOPHYTO ·

c.maisonneuve@
agrobioperigord.fr
07 88 02 29 38



Conseil et formations bio
biodynamiques ·
Coordination
expérimentations ·
Réfèrent viticulture
biologique pour la FNAB
et l'ITAB ·

e.maille@
agrobioperigord.fr
06 87 58 48 50

NOS PARTENAIRES RÉSEAU



NOS RÉSEAUX SOCIAUX

 [YouTube](#)

 [Groupe Facebook Viti
AgroBio Périgord](#)

Parce que...

- ✓ Je soutiens **une agriculture bio et locale en Dordogne**
- ✓ Je veux faire partie d'un réseau de **plus de 650 adhérents**
- ✓ Mon adhésion est **essentielle** pour la vie du réseau et permet de **peser sur les politiques publiques** liées à la bio (aides...)

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION

 L'adhésion en ligne en 5 min, c'est **par ici** !



• **AGROBIO PÉRIGORD** •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

Ou télécharger le
bulletin d'adhésion
papier

Note : sur présentation de votre justificatif d'adhésion, VBNA (Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine) applique une remise de 40 € à votre cotisation !

**Nouvelle
ADRESSE**

AgroBio Périgord
Pôle Pomport (viticulture)
Route du Lac
24240 POMPORT

Nous partageons les locaux avec les
Vignerons Indépendants de Dordogne

Cette action est réalisée grâce à nos adhérents.

Avec le soutien financier de :

