



• AGROBIO PÉRIGORD •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

→ **Mardi 30 juin 2026**

Viticulture bio

BULLETIN TECHNIQUE N°09

PROCHAIN BULLETIN :
Mardi 14 juillet

Interbulletin
Mardi 07 juillet

Du côté
des maladies

P 2

Du côté
des insectes

P 3

Pour aller plus loin...
La position de la Lune

P 5

Focus
Météo

P 4

Focus
technique

P 6

Historique
Réseau de surveillance

P 8



Événements à venir

SAVE THE DATE Mercredi 01 juillet : Après-midi autour des nouvelles variétés résistantes aux maladies, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de Dordogne. Toutes les infos dans l'email.

OBSERVATIONS

Le millésime 2026 se distingue par une précocité exceptionnelle, avec l'apparition des premières baies verées sur plusieurs secteurs.

Les conditions climatiques extrêmes créent de forts contrastes : certaines parcelles, bien alimentées en eau, continuent de croître, tandis que d'autres, sur sols filtrant montrent des signes de stress hydrique (feuilles qui pincet, jaunissement, défoliation). Les températures caniculaires dépassant 40°C, combinées à un vent sec, ont provoqué des brûlures sur feuilles et des échaudages sur les grappes exposées, notamment sur les pieds jeunes ou en stress.

La sécheresse persistante et ces fortes chaleurs aggravent les symptômes de souffrance de la vigne, avec des carences, des dessèchements de feuilles ou de baies, et des syndromes d'ESCA/BDA. Sans pluie dans les deux prochaines semaines, ces phénomènes devraient s'intensifier, surtout sur les secteurs peu arrosés.

Stades



Stade moyen :
fermeture de grappe **BBCH 79**

33 - Fermeture de la grappe



POINT MÉTÉO

Après les dernières précipitations, avec des cumuls assez disparates sur le vignoble (de 8mm à 33 mm) et des températures de saison, un temps chaud et sec va s'installer pour la semaine. L'augmentation des températures est prévue à compter de la fin de semaine, annonçant un retour à des maximales approchant les 40°C, pour le week-end prochain. Aucune pluie n'est à ce jour annoncée.

Il faudra rester vigilant et surveiller tout changement qui pourrait survenir, pour s'adapter au plus juste.

Moyenne / 20ans : Déficit hydrique des 30 derniers jours : 49% (-34 mm) Déficit hydrique des 12 derniers mois : 15 % (-112 mm).





DU CÔTÉ DES MALADIES

Transfert de connaissances

Mildiou

Fiche INRAE, Cliquez ici

Risque

Faible à très faible

TNT au 30/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le vignoble est globalement sain. Légère extension des symptômes sur des parcelles déjà contaminées uniquement. Les températures estivales de ce début de semaine vont redevenir caniculaires sur la fin de semaine et se prolonger sur la semaine suivante. La présence quotidienne de vent va persister. Le risque potentiel mildiou est faible à très faible sur la totalité du vignoble. Sous les prévisions actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination sur l'ensemble du secteur Nord-Aquitaine. Source BSV -n°14- Edition Nord Aquitaine - 30/06/2026).

Oïdium

Fiche INRAE, Cliquez ici

Risque

Faible à Moyen

TNT au 30/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Les symptômes observés restent extrêmement rares sur le vignoble. L'arrivée des toutes premières baies verrées annonce la fin toute proche de sensibilité des baies de raisin à l'Oïdium. Le risque potentiel oïdium est stable. La fin de grande de sensibilité des grappes est proche ou atteinte pour la majorité des parcelles (stade L33/Fermeture de la grappe). Sous les prévisions météo actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination. (Source BSV -n°14- Edition Nord Aquitaine - 30/06/2026).

Black Rot

Fiche INRAE, Cliquez ici

Risque

Fort à Très fort

TNT au 30/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 1 %

Fréquence : 5 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le vignoble reste très sain et la situation n'évolue pas. Les températures estivales de ce début de semaine vont redevenir caniculaires sur la fin de semaine et se prolonger sur la semaine suivante. Sous les prévisions actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination. (Source BSV -n°14- Edition Nord Aquitaine - 30/06/2026)

Botrytis

Fiche INRAE, Cliquez ici

Risque

Nul

TNT au 30/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le risque est toujours nul : pas de nouveaux symptômes observés sur feuilles (en général suite blessures, vents, palissage, matériel, etc.), aucun symptôme sur grappes dans notre réseau. Le meilleur anti botrytis reste toujours la prophylaxie.

NOTES



Priorités INCHANGÉES !!! Suivant pousse & lessivage : possibilités de basculer en mode « lessivage » ou recouvrir avant prochaines pluies...

En l'absence de pluie, si pas de traitement, maintenez une vigilance accrue de vos parcelles !!!

Entretien du sol :

Sous le rang :

Priorité : Éviter que les adventices ne gênent la qualité de pulvérisation !!!

Voir bulletins précédents... La plupart des domaines ont profité du temps des dernières semaines pour ce mettre à jour.

Inter-rang :

Si croûte de battance, remettre en porosité par un griffage superficiel. De plus cela permettra de stimuler la minéralisation du sol et permettra de satisfaire les besoins de la vigne en Azote [\[cliquer ici\]](#).

Epamprage / Ebourgeonnage :

Surveiller repousses. Passage si nécessaire.

Relevages :

Normalement les vignes sont à jour, les chantiers suivent la pousse... Toujours prioritaire avant prochaines pluies et prochain traitement !!!
Rappel : voir bulletins précédents.

Rognage : En cours ou déjà fait sur parcelles précoces et/ou vigoureuses. Sauf urgence, évitez de rogner lors des épisodes de fortes chaleurs (>35°C).

Pour évitez du stress à la vigne et avoir de meilleur débit de chantier/résultats. Pensez à Rogner malin...

Plus d'infos ? Cliquez Ici !

Echaudage : Toujours d'actualité, notamment si parcelle à risque vu fortes chaleurs encore annoncées semaine prochaine. Il est possible d'utiliser de l'argile kaolinite calcinée ou de l'hydroxyde de calcium comme barrière physique. Dosage : 15-20kg/ha pour 200 à 250L/ha de bouillie = 5-7%. Privilégiez les grosses gouttes pour éviter leur évaporation avant d'avoir atteint le feuillage. Privilégier les faces Ouest et Sud. [Carte des distributeurs](#) en Dordogne et limitrophes.

Les dégâts sur feuilles sont en hausse même si limités pour l'instant. Des symptômes sont également visibles sur baies. **Plus d'infos ? Cliquez ici !**
(Source : bulletin CAB-P.L., Kady SONKO)



Téléchargez **le point infos** sur la prophylaxie



CONSEILS

Traitement : Beaucoup de parcelles ont été basculées en mode « lessivage », donc c'est surtout les pluies reçues ou non ET le niveau de risque qui vont définir votre stratégie, les parcelles lessivées devront absolument être recouvertes avant prochaines pluies :

Mode « Lessivage » et traitement non lessivé :

- Parcelles exemptes de symptômes (ou très faibles) et/ou vigne peu développée : Impasse et surveillez évolution Oïdium et Black Rot.
- Parcelles avec présence régulière de symptômes et/ou vigne très développée : 250-300 g de Cu métal/ha associé à 2-3 Kg de soufre pur.

Suivant l'état phytosanitaire du vignoble et le niveau de risque, 2 scénarios possibles suivant votre situation :

- Parcelles exemptes de symptômes (ou très faibles) et/ou risque faible : Impasse ou 250-300g de Cu métal/ha associé à 2-3 Kg de soufre pur
- Parcelles avec présence régulière de symptômes et/ou risque fort : 350-400g de Cu métal/ha associé à 3-4 Kg de soufre pur.

Si forte présence ou en cas de passif : V° bulletin précédent; Attention à ne pas trop forcer avec le soufre si T° très élevées. **Possible arrêter soufre, si pas de passif Black Rot ou Oïdium et à condition de maintenir surveillance ! Cas Particuliers :** V° Bulletins précédents ou nous contacter.



DU CÔTÉ DES INSECTES

Transfert de connaissances

Cicadelle FD

Les stades larvaires observés sont de plus en plus avancés et en nette diminution: L4 (--) et L5 (-). Quelques rares captures d'adultes sur le réseau. Rognez en dernier les parcelles présentant des symptômes ou ayant eu des pieds infectés détectés l'an dernier par la prospection. Réseau : Moyenne 0.3 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 2 Diminution. **Prophylaxie :** Toutes les informations en [cliquant ici](#). On voit apparaître les premiers symptômes. Ne supprimez pas les organes porteurs de symptômes pour ne pas gêner la prospection ! (cela n'empêchera pas les contaminations).

Tordeuses

Le vol de G2 est en baisse : Mini : 0 / max : 14 / moy : 1.7 adulte/sem Diminution. Pas de nouvelles pontes cette semaine, on observe uniquement des écloses (possiblement du fait de la canicule – reprise possible). A surveiller pour déterminer les dates de traitement si nécessaire. Seuil de déclenchement à 5 pontes pour 100 grappes et au plus proche des stades tête noire. Avec les fortes températures, les stades évolueront vite, mais on a aussi dessèchement de certaines pontes. Moyenne pontes 0 pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 0. **Quelques perforations avec jeunes larves :** Moyenne perfos 2 pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 8 Augmentation.

Cicadelles vertes

Le vol de G2 en baisse. Présence faible de larves observées. Rares dégâts sur feuilles. Réseau : Mini : 0 / max : 5 / moy : 0.7 adulte/sem (Diminution). Moyenne 0.8 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 4 (Diminution). Moyenne 0% Dégâts pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 0% (stable). possibilité de réaliser un traitement insectifuge si historique (purins de fougères à 10 % ou barrière physique [plus d'infos cliquez ici](#)).

NOTES

Biodiversité et auxiliaires : Rappels et Détails voir bulletins précédents.

L'activité reste très réduite tant des ravageurs que des auxiliaires malgré le redoux des températures et les pluies. On constate toujours la présence de certains auxiliaires tels que les araignées, les punaises (dont [diabolique](#)), quelques syrphes et coccinelles... On observe toutefois un retour en force des papillons. Baisse de la présence des larves de *Zygina rhamni*, mais on trouve plus régulièrement des traces de ses dégâts sur feuilles qui restent négligeables.

Erinose : Très faible présence cette année, pour l'instant, rares nouveaux symptômes sur feuilles, sans gravité.

Enherbement : 2 questions à se poser avant de sortir le gyrobroyeur : 1) Est-ce que le couvert gêne la qualité de pulvérisation ? 2) Est-ce que le couvert maintien une hygrométrie favorable à la maladie ? – Si vous répondez « Non » à ces 2 questions = Pas de tonte !!! Vu la météo actuelle, laissez les couverts à paille, ne surtout pas les tondre si possible ou alors à au moins 8-10 cm

CONSEILS

CFD : UNIQUEMENT pour la Dordogne et Lot & Garonne : Tous les traitements sont terminés !!! [Cliquez Ici](#). **RAPPEL :** Les messages des GDON pour traitement **ALDUTICIDES NE CONCERNENT PAS** les utilisateurs de **Pyrèthres naturel**.

Eudémis : Pas de nouvelles pontes de G2, A surveiller ! La canicule peut expliquer l'absence de nouvelles pontes. Possible reprise avec le redoux de cette semaine. Attention car la pression eudémis est très ponctuelle : observez sur VOS parcelles !

NOTE : L'utilisation d'une barrière physique de type argile kaolinée calcinée, en plus de l'effet insectifuge, atténuera les dégâts dus à l'échaudage physiologique (voir p 2). Elle pourra aussi avoir un effet sur les tordeuses dans leur reconnaissance des sites de pontes (baies). Privilégier une application en plein et non centrée sur grappe pour une meilleure efficacité.

Attention : éviter l'argile au stade fermeture de grappe. De l'argile risquerait de se trouver enfermée dans la grappe et de relarguer de l'humidité plus tard dans la saison favorisant le botrytis.

↓ En images...



Début symptômes FD



Début symptômes FD



Esca/BDA (maladie du bois)



Brûlure sur feuilles : coup de soleil



Brûlure sur feuilles : coup de soleil



Erinose – face inférieure de la feuille



Erinose – face supérieure de la feuille



Larve cicadelle pruineuse



Punaise Coreidae



Cicadelle italienne *Zygina rhamni*

Relevé météo, par secteur

	Du 23 juin au 30 juin					
	Températures (°C)			Précipitations (mm)		
	mini.	max.	Moyen.	mini.	max.	Cumul
Bergerac	17,8	42,8	29,2	0	5,9	11,3
Villefranche de Lonchat	16,4	41,8	27,8	0	7,2	8,9
Montcaret	16,6	40,4	27,5	0	8,9	11,1
Pineuilh	17,2	41,4	28,4	0	16,4	28,2
Saint Astier (47)	16,8	40,8	28	0	14,4	32,1
Sigoulès	16,4	40,8	27,7	0	7,9	12,6
Saint Jean de Duras (47)	17	41	28,1	0	11,2	17,8
Creysensac & Pissot	17,4	40,6	28,3	0	13,9	17,4

Prévisions météo à une semaine, par secteur

Précipitations en mm

0

< 4

< 15

> 15

Prévisions semaine à venir	Mer 01.07			Jeu 02.07			Ven 03.07			Sam 04.07			Dim 05.07			Lundi 06.07		
	Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations		
	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)	mini.(°C)	max.(°C)	Pluv.(mm)
Bergerac	17	27	-	15	30	-	18	31	-	17	34	-	19	37	-	18	35	-
Villefranche de Lonchat	16	28	-	15	29	-	18	29	-	16	32	-	18	38	-	20	38	-
Montcaret	16	27	-	15	29	-	18	30	-	17	33	-	19	37	-	18	35	-
Pineuilh	17	27	-	16	29	-	18	30	-	18	34	-	19	37	-	18	35	-
Saint Astier	16	27	-	16	29	-	18	30	-	18	33	-	19	37	-	18	35	-
Sigoulès	16	27	-	15	29	-	18	30	-	17	33	-	19	37	-	18	35	-
Saint Jean de Duras	16	27	-	16	29	-	18	30	-	18	33	-	19	38	-	18	36	-
Creysensac & Pissot	15	27	-	15	29	-	19	29	-	16	31	-	18	36	-	19	37	-



POUR ALLER PLUS LOIN...

Les informations ci-dessous ne sont valables que dans le respect des bonnes pratiques agronomiques et biologiques respectueuses du sol et de la plante, en intégrant autant que possible l'approche globale de son vignoble.

Préparations de phytothérapie et/ou biodynamie à utiliser actuellement

📄 Téléchargez [l'article phytothérapie](#) et cliquez sur lien (en vert) pour les [fiches par plante](#), ou demandez-les à vos techniciens

[Ortie](#) [Prêle](#) [Reine des prés](#) [Valériane](#) [Pissenlit](#) [Sauge](#) [Voir Bulletins Précédents](#)
(stress – rognage-éffeuilage)

Camomille

En Tisane à 10%, on utilise les fleurs seulement. Riche en Soufre, Calcium & Potassium. A un Rôle de régulation, en préventif et en accompagnement de la vigne pour de nombreuses maladies (notamment Mildiou). **Intéressant pour « humidifier » la vigne, notamment parcelle sensible échaudage (idem tisane Ortie).** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

Fougères

En Purin à 10 %, Préférez la Fougère Aigle (*Pteridium aquilinum*), à défaut la Fougère Mâle (*Dryopteris filixmas*). Action Insectifuge. Est utile contre les cicadelles vertes à conditions de renouveler vos traitements tous les 8-10 jours maximum, sinon pas d'efficacité. Ce sont les feuilles (frondes) que l'on prépare en purin. (1Kg de feuilles fraîches ou 100 g de sèches dans 10 litres d'eau).

Consoude

En Purin ou « pur jus », permet d'aider les plantes en situation de stress, aide à la fructification, permettrait de réduire les doses de soufre. Plante riche en fer, bore et potasse. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures. Intéressant aussi si rognage ou effeuillage.**

Achillée

En Tisane (10%), on utilise la plante entière, Riche en Soufre, Sucre & Potasse. Aide à lutter contre la coulure & favorise la floraison. Contient également des huiles volatiles & de l'acide Salicylique, qui permettraient la réduction des doses de Soufre. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

501

Possible d'utiliser la 501, entre 2 & 4g/ha. Suivant la météo à venir, une ou plusieurs applications peuvent être envisagées après la Fleur, notamment pour renforcer la plante et stimuler ses défenses suite aux conditions météo (forte amplitude thermique, manque de luminosité et de chaleur, présence de maladies et notamment Mildiou). Possibilité d'ajouter quelques gouttes de valériane (507), en début de dynamisation, sauf si forte présence de mildiou. **A ne pas trop utiliser par temps lumineux et sec. Ne pas utiliser sur des vignes chétives.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#). **Contactez-nous si questions.**



LA POSITION DE LA LUNE

Prendre en compte la position de la lune dans mes travaux :

Lune montante jusqu'au **12/07**
et **descendante** jusqu'au **26/07**

Lune croissante jusqu'au **29/07**
et **décroissante** jusqu'au **14/07**

Pour repousse plus lente tondre les couverts en jours fleurs ou racines en :

Lune descendante : 14 juillet & 19 au 23 juillet



Période favorable aux préparations préventives des **maladies** **02-03/07 & 09-12/07**



Période favorable aux préparations préventives des **insectes** **02-03/07 & 11-14/07**



Période favorable limitant les germinations des **adventices** : **02-03 juillet**
travail sous le rang



Prochains **nœuds lunaires** **04/07 à 10h**



Prochain **périgée** **13/07 à 10h**

Éviter le travail des sols et de la plante pendant les nœuds lunaires (2 par mois) et la Lune en périgée (1 par mois).

N'hésitez pas à contacter votre technicien.ne-conseil pour toute information complémentaire.

CALENDRIER BIODYNAMIQUE ↓

Dates	Mer 01/07	Jeudi 02/07	Ven 03/07	Sam 04/07	Dim 05/07	Lun 06/07	Mar 07/07	
Jour								
Dessous rang				Ω				Jour fruit
Inter rang				Ω				Jour racine
Tonte couvert				Ω				Jour fleur
Epamprage-Effeuilage-Rognage				Ω				Jour feuille

Le soleil est dans la constellation des Gémeaux et y restera jusqu'au 19/07 où il entrera dans celle du Cancer.


Cueillette des plantes pour tisanes et préparations biodynamiques : se réalise au stade tout début floraison de la plante, le matin, par très beau temps en évitant les jours feuilles et le périgée et en favorisant les jours fleurs et l'apogée. Évitez aussi les bords de route très fréquentés ou trop pollués par l'activité humaine ou agricole. Pour les plantes à faire sécher, préférez la lune décroissante ET montante.

Note concernant la biodynamie : il faut d'abord respecter et maîtriser les règles de l'agronomie, de l'agriculture biologique et seulement ensuite la biodynamie peut apporter un plus à votre domaine et à vos vins. C'est pourquoi nous conseillons de se concentrer sur les fondamentaux cette année, le temps d'acquiescer tout le matériel nécessaire et de mettre les vignes au propre, une fois cela fait on pourra envisager une évolution sereine vers la biodynamie.

📄 Plus d'infos sur [la mise en œuvre de la biodynamie](#)

📄 Plus d'infos sur [l'approche du sol en biodynamie](#)

← [Retour au sommaire](#)



Intensité d'attaque par la Pourriture grise selon les pratiques d'effeuillage (Colombar, 1997, étude IFV)

Les Effeuillages permettent une meilleure aération de la zone des grappes, baisse de l'hygrométrie favorable aux maladies, ils doivent aussi permettre de laisser passer la lumière, sans mettre les grappes à nues ; Ils permettront également à vos traitements de mieux pénétrer la zone fructifère. Plus ils sont faits tôt, moins vous blessez les baies et meilleure sera leur efficacité.

Les points à prendre en compte avant d'effeuiller :

- Les parcelles les plus sujettes aux maladies fongiques devront être soigneusement effeuillées.
- Les cépages les plus sensibles aux coups de soleil et aux coups de chaud devront être effeuillés plus rapidement ou partiellement.

Evitez d'effeuiller les faces exposées au soleil de l'après-midi.

Diamètre baies (mm)	Augmentation de la surface (fois)
1	-
2	x 4
3	x 9
4	x 16
5	x 25
6	x 36
7	x 49
8	x 64
9	x 81
10	x 100




Importance d'accompagner la pousse : de la chute des capuchons floraux au stade fermeture de la grappe : la surface est 25 fois supérieure entre une baie de 1 mm et 5 mm : voir tableau ci-dessus).

Source : Bulletin technique FIBL & Bulletin CAB Pays de la Loire, saison 2023.

Rappel sur les délais d'incubation : Graphique représentant la durée d'incubation du mildiou en fonction de la température :

ATTENTION aux données sur feuilles !!
Les délais d'INCUBATION sur inflorescences ou baies sont plus longs, généralement....



Source BSV : Les données pour réaliser ce graphique sont issues du livre « Maladies cryptogamiques de la vigne : champignons parasites des organes herbacés et du bois de la vigne », Dubos B, 1999, eds Féret, Bordeaux.



FOCUS TECHNIQUE

Point Stratégie : Quand Basculer ?

De quoi s'agit-il ? En vigne on applique 2 stratégies différentes :

- **Du débourrement à Fermeture de la Grappe (FG) : Stratégie « accompagnement de la pousse ».** Le lessivage est limite secondaire... C'est la stratégie qui concentre le plus de traitements.
- **De fermeture de la grappe à maturité : Stratégie « Lessivage ».** On attend que le dernier traitement ait été lessivé ET de nouvelles pluies pour renouveler un traitement. C'est la stratégie qui permet de limiter le nombre de traitements.

Rappel sur le basculement de stratégie : Si la vigne a atteint sa surface foliaire & surface grappes maximum (càd que stad FG) atteint & que tous les entre-cœurs sont sortis et peuvent être éliminés à la rogneuse) : Si ET Seulement si, ces 2 conditions sont réunies : On peut basculer de stratégie : càd, On arrête de suivre la pousse & on renouvelle en fonction du lessivage. **IL EST IMPERATIF DE MAINTENIR LA SURVEILLANCE, notamment sur le Black Rot & l'Oïdium avec cette stratégie.**

Les nouvelles pousses qui pourraient être contaminées par la pluie seront éliminées avec la rogneuse, si les parcelles ont bien acquis leur palissage maximum. Tout en veillant à ne pas créer de blessures sur les grappes.

En cas d'apparition d'oïdium, on pourra effectuer un soufre fleur en poudrage, à 20 Kg/ha, qui a de bons effets curatifs sur les tous 1^{ers} symptômes. **Si parcelle avec historique important, et que vous ne souhaitez pas traiter préventivement avec pulvérisateur**, possible de réaliser poudrage, même dose mais avec un soufre « Trituré » (moins effet choc, mais rémanence plus importante). Attention si vous faites un poudrage, ne pas associer à de l'argile tant que stade FG pas totalement atteint (risque d'augmenter l'hygrométrie à l'intérieur de la grappe, à cause de argile « emprisonné »...)

- **Détails Stratégies et Options : Voir Page 2**
- **Les doses de cuivre métal, seront à adapter en fonction du niveau de pression passée et au moment des traitements, ces points là feront l'occasion de précisions/adaptations dans les prochains bulletins.**

*Parcelles avec symptômes d'Oïdium / Black Rot marqués : Augmenter la dose de soufre pur à 6-8 Kg. Suivant année, historique, etc. à partir de fermeture de la grappe, suivant état phytosanitaire, niveaux de risques, on pourra réduire, sur de nombreuses parcelles. Pour cette année il est trop tôt pour décider arrêt soufre, mais à voir d'ici 7-10 jours, vu faibles niveaux actuels du Black Rot et de l'Oïdium. **En cas de forte attaque de Black Rot : Resserrez les cadences et ne plus faire d'impasse !! N'hésitez pas à nous contacter pour optimiser vos stratégies !!!!***

Note sur les baies millerandées : Attention aux baies millerandées, qui vont rester vertes plus longtemps et se développer plus lentement, donc rester très sensibles à l'Oïdium et au Mildiou. Ce phénomène est assez marqué cette année sur de nombreuses parcelles ; Il faut maintenir la vigilance (sans s'alarmer).

Jusqu'à la fin de saison : Suivant évolution des symptômes sur le haut du feuillage, privilégiez un rognage court (de manière à éliminer un maximum de feuilles contaminées & à favoriser l'émergence de nouvelles pousses dans un environnement sain !! **Attention à rogner, dès premier passage, assez haut par rapport dernier fil (suivant votre palissage) afin de garder une marge de manœuvre, en fin de saison. En fin de saison : Attention à ne pas rogner des bois aoûtés !!**

RAPPEL : Jusqu'à fermeture de la grappe / 1^{ers} rognages – palissage maximum, la PRIORITE sera l'ACCOMPAGNEMENT de la POUSSE et NON LE LESSIVAGE ! Traitez toujours : Avant la pluie ET au plus proche de la pluie, de manière à couvrir au maximum la pousse.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter vos technicien.ne.s !



HISTORIQUE – RÉSEAU DE SURVEILLANCE


Données issues du réseau de piégeage et de surveillance d'AgroBio Périgord

Données mises à jour le : 30/06/2026


11 Participants, 21 pièges en 2026

Graphiques synthétisant les principales données de 2026 :

Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Eudémis



Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Cicadelles Vertes



NOUS CONTACTER



Coordination du pôle
Cépages résistants ·
RESAQ Vitibio & RESAQ
Ferti ·

coordoviticulture@
agrobioperigord.fr
06 07 72 54 36



Réseau de surveillance ·
Conseil et formations
tailles-greffage-curetage
· Réseau DEPHY-
ECOPHYTO ·

c.maisonneuve@
agrobioperigord.fr
07 88 02 29 38



Conseil et formations bio
biodynamiques ·
Coordination
expérimentations ·
Réfèrent viticulture
biologique pour la FNAB
et l'ITAB ·

e.maille@
agrobioperigord.fr
06 87 58 48 50

NOS PARTENAIRES RÉSEAU



NOS RÉSEAUX SOCIAUX

 [YouTube](#)

 [Groupe Facebook Viti
AgroBio Périgord](#)

Parce que...

- ✓ Je soutiens **une agriculture bio et locale en Dordogne**
- ✓ Je veux faire partie d'un réseau de **plus de 650 adhérents**
- ✓ Mon adhésion est **essentielle** pour la vie du réseau et permet de **peser sur les politiques publiques** liées à la bio (aides...)

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION

 L'adhésion en ligne en 5 min, c'est **par ici** !



• **AGROBIO PÉRIGORD** •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

Ou télécharger le
bulletin d'adhésion
papier

Note : sur présentation de votre justificatif d'adhésion, VBNA (Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine) applique une remise de 40 € à votre cotisation !

**Nouvelle
ADRESSE**

AgroBio Périgord
Pôle Pomport (viticulture)
Route du Lac
24240 POMPORT

Nous partageons les locaux avec les
Vignerons Indépendants de Dordogne

Cette action est réalisée grâce à nos adhérents.

Avec le soutien financier de :

