



• AGROBIO PÉRIGORD •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

→ **Mardi 21 juillet 2026**

Viticulture bio

BULLETIN TECHNIQUE N°10

PROCHAIN BULLETIN :
Mardi 28 juillet

PROCHAIN INTER-BULLETIN :

Du côté
des maladies

P 2

Du côté
des insectes

P 3

Pour aller plus loin...
La position de la Lune

P 5

Focus
Météo

P 4

Focus
technique

P 6

Historique
Réseau de surveillance

P 8

Événements à venir

SAVE THE DATE Mercredi 29 juillet 9h-11h : Fertilité des sols
viticoles avec Florian Bassini
Château le Payral, Le Bourg, Razac de Saussignac
Inscriptions sur le site

SAVE THE DATE jeudi 30 juillet (secteur Ouest) et vendredi 31 juillet (secteur sud) : conseil collectif mobile G3 d'eudémis
Lieu : à venir (selon participants)
Inscriptions : c.maisonneuve@agrobioperigord.fr - 07 88 02 29

OBSERVATIONS

Les semaines se suivent et se ressemblent : la semaine a été marquée par des températures un peu moins chaude, avec des précipitations significatives par endroit (> à 20 mm sur certains secteurs).

Les stades phénologiques dans l'ensemble progressent peu voir pas. Sauf sur les secteurs arrosés, la vigne reste bloquée et l'on constate de manière encore plus marquée les nombreux signes de souffrance de la vigne.

La véraison commence, pour certains cépages doucement.

Stades



35 - Fermeture de la grappe



36 - Début véraison

Stades observés : fermeture de la grappe **BBCH 79** à début véraison **BBCH 81**



POINT MÉTÉO

Les températures de cette prochaine vont légèrement baissées et l'amplitude thermique va s'accroître, avec des écarts allant de 14°C au matin à 34/36°C en fin de journée. Les moyennes journalières vont sensiblement baisser.

Cette baisse des températures sera accompagnée par quelques précipitations à compter de la nuit de vendredi à samedi, qui pourront être de nature orageuse. Les cumuls restent, à ce jour inférieur à 5 mm.

Les prévisions étant peu fiables à ce jour, restez vigilant.

Moyenne / 20ans : Déficit hydrique des 30 derniers jours : 46% (-19 mm) Déficit hydrique des 12 derniers mois : 3 % (-24 mm).





DU CÔTÉ DES MALADIES

Transfert de connaissances

Mildiou

[Fiche INRAe, Cliquez ici](#)

Risque

Faible à très faible

TNT au 21/07

St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Sur la très grande majorité de vignoble, la situation est saine et n'évolue pas ou très peu depuis plusieurs semaines. Un temps sec et chaud est encore prévu cette semaine. Une probable petite perturbation devrait entrer en Nord-Aquitaine au cours de la toute fin de semaine, mais les pluies annoncées demeurent faibles et encore très incertaines. L'axe Langon-Sainte-Foy La Grande, les plus arrosés lors des dernières précipitations est marqué par un risque fort voire très fort. En cas de précipitations orageuses, seuls les secteurs à risque fort pourraient présenter des contaminations sur feuilles. (Source BSV - n°17 - Edition Nord Aquitaine - 21/07/2026).

Oïdium

[Fiche INRAe, Cliquez ici](#)

Risque

Faible à Moyen

TNT au 21/07

St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Les symptômes observés sont rares et de très faibles ampleurs sur le vignoble. Le stade "premières baies véreuses" est atteint sur une majorité des parcelles et annonce la fin de la période de forte sensibilité des baies de raisin à l'Oïdium. Le risque potentiel oïdium est stable depuis plusieurs semaines. La fin de grande de sensibilité des grappes est atteinte sur toutes les parcelles du réseau BSV (stade L33/Fermeture de la grappe). La véraison des grappes annonce la fin de réceptivité à l'Oïdium. Le modèle n'envisage pas de contamination. (Source BSV - n°17 - Edition Nord Aquitaine - 21/07/2026).

Black Rot

[Fiche INRAe, Cliquez ici](#)

Risque

Fort à Très fort

TNT au 21/07

St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le vignoble reste très sain et la situation n'évolue pas. Un temps sec et chaud est encore prévu cette semaine. Une probable petite perturbation devrait entrer en Nord-Aquitaine au cours de la toute fin de semaine, mais les pluies annoncées demeurent faibles et encore très incertaines. Sous les prévisions actuelles, le modèle n'envisage pas de contamination (Source BSV - n°17 - Edition Nord Aquitaine - 21/07/2026).

Botrytis

[Fiche INRAe, Cliquez ici](#)

Risque

Nul

TNT au 21/07

St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le risque est toujours nul : pas de nouveaux symptômes observés sur feuilles (en général suite blessures, vents, palissage, matériel, etc.), aucun symptôme sur grappes dans notre réseau. Le meilleur anti botrytis reste toujours la prophylaxie.

NOTES



Priorités INCHANGEES !!! Suivant pousse & lessivage : possibilités de basculer en mode « lessivage » ou recouvrir avant prochaines pluies...

En l'absence de pluie, si pas de traitement, maintenez une vigilance accrue de vos parcelles !!!

Entretien du sol :

Sous le rang :

Priorité : Eviter que les adventices ne gênent la qualité de pulvérisation !!!

Voir bulletins précédents... La plupart des domaines ont profité du temps des dernières semaines pour ce mettre à jour.

Inter-rang :

Si croûte de battance, remettre en porosité par un griffage superficiel. De plus cela permettra de stimuler la minéralisation du sol et permettra de satisfaire les besoins de la vigne en Azote [\[cliquer ici\]](#).

Epamprage / Ebourgeonnage :

Surveiller repousses. Passage si nécessaire.

Relevages :

Normalement les vignes sont à jour, les chantiers suivent la pousse... Toujours prioritaire avant prochaines pluies et prochain traitement !!!
Rappel : voir bulletins précédents.

Rognage : En cours ou déjà fait sur parcelles précoces et/ou vigoureuses. Sauf urgence, évitez de rogner lors des épisodes de fortes chaleurs (>35°C).

Pour éviter du stress à la vigne et avoir de meilleur débit de chantier/résultats. Pensez à Rogner malin...

Plus d'infos ? Cliquez ici !

Echaudage : Toujours d'actualité, notamment si parcelle à risque vu fortes chaleurs encore annoncées semaine prochaine. Il est possible d'utiliser de [l'argile kaolinite calcinée](#) ou de l'hydroxyde de calcium comme barrière physique. Dosage : 15-20kg/ha pour 200 à 250L/ha de bouillie = 5-7%. Privilégiez les grosses gouttes pour éviter leur évaporation avant d'avoir atteint le feuillage. Privilégier les faces Ouest et Sud. [Carte des distributeurs](#) en Dordogne et limitrophes.

Les dégâts sur feuilles sont en hausse même si limités pour l'instant. Des symptômes sont également visibles sur baies. **Plus d'infos ? Cliquez ici !**
(Source : bulletin CAB-P.L., Kady SONKO)



Téléchargez **le point infos** sur la prophylaxie



CONSEILS

Traitement : Beaucoup de parcelle ont basculées en mode "lessivage", donc c'est surtout les pluies reçues ou non ET le niveau de risque qui vo nt définir votre stratégie, les parcelles lessivées devront absolument être recouvertes avant les prochaines pluies.

- Parcelles avec feuillage sain & vendanges précoces : si actuellement couvert => arrêt de la protection. Privilégiez la prophylaxie
- Parcelles avec feuillage sain & vendange tardives : attendre, privilégiez la prophylaxie & éventuellement veillez à être recouvert avant de nouvelles pluies, avec un sulfate et/ou Hydroxyde **200 – 300 g Cu métal**
- Parcelles feuillage attaqué par le mildiou, traitez avant toute pluie > 10 mm avec sulfate et/ou hydroxyde **300 – 350 g Cu métal**

Si forte présence ou en cas de passif : voire bulletins précédents. Attention à ne pas trop forcer avec le soufre si T° élevées (> 28 °C). Possible d'arrêter le soufre si pas de passif Black Rot ou Oïdium, et à condition de maintenir une surveillance. Si besoin nous contacter.



DU CÔTÉ DES INSECTES

Transfert de connaissances

Cicadelle FD

Pas d'observation de stades larvaires cette semaine. Quelques captures d'adultes sur le réseau. Rognez en dernier les parcelles présentant des symptômes ou ayant eu des pieds infectés détectés l'an dernier par la prospection. Réseau : Mini : 0 / max : 3 / moy : 0.4 adulte/sem *Légère augmentation*. **Prophylaxie** : Toutes les informations en [cliquant ici](#). Soyez attentifs à l'apparition de symptômes. Ne supprimez pas les organes porteurs de symptômes pour ne pas gêner la prospection ! (cela n'empêchera pas les contaminations).

Tordeuses

Le vol de G3 est en augmentation : Mini : 0 / max : 36 / moy : 6.6 adulte/sem. On a également apparition des premières pontes de G3 cette semaine secteur Ouest (Gironde et poche Gironde), Nombre et stades à surveiller pour déterminer les dates de traitement si nécessaire. Seuil de déclenchement à 5 pontes pour 100 grappes et au plus proche des stades tête noire. Avec les fortes températures, les stades évolueront vite, mais on a aussi dessèchement de certaines pontes. *Moyenne pontes 3.7 pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 30. Des perforations vides de G2 en cours de dessèchement: Moyenne perfos 14.3 pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 90 Augmentation.*

Cicadelles vertes

En attente du troisième vol. Présence faible de larves observées. Rares dégâts sur feuilles. Réseau : Mini : 0 / max : 1 / moy : 0.3 adulte/sem *Diminution*. *Moyenne 0.2 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 2 Diminution. Moyenne 0% Dégâts pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 0.1% Stable.*

NOTES

Biodiversité et auxiliaires : Rappels et Détails voir bulletins précédents.

L'activité reprend au vignoble avec le retour de températures plus clémentes. Les populations de ravageurs restent faibles (notamment cicadelles), mais on fait face à un retour d'eudémis ! On constate toujours la présence de certains auxiliaires tels que les araignées (particulièrement nombreuses en ce moment), les punaises (dont [diabolique](#)), quelques syrphes et coccinelles, des papillons,... Baisse de la présence des larves de *Zygina rhamni*, mais on trouve plus régulièrement des traces de ses dégâts sur feuilles qui restent négligeables. Avec les fortes températures, elle prend le pas sur la cicadelle verte car davantage thermophile.

Erinose : Très faible présence cette année, pour l'instant, rares nouveaux symptômes sur feuilles, sans gravité.

Galle phylloxérique : quelques nouveaux symptômes intenses sur jeunes feuilles, mais sans gravité.

Enherbement : 2 questions à se poser avant de sortir le gyrobroyeur : 1) Est-ce que le couvert gêne la qualité de pulvérisation ? 2) Est-ce que le couvert maintien une hygrométrie favorable à la maladie ? – Si vous répondez « Non » à ces 2 questions = Pas de tonte !!! Vu la météo actuelle, laissez les couverts à paille, ne surtout pas les tondre si possible ou alors à au moins 8-10 cm

CONSEILS


CFD : UNIQUEMENT pour la Dordogne et Lot & Garonne : Tous les traitements sont terminés !!! [Cliquez ici](#). **RAPPEL** : Les messages des GDON pour traitement **ALDUTICIDES NE CONCERNENT PAS** les utilisateurs de **Pyrèthres naturel**.

Eudémis : APPARITION DES PONTES DE G3 !!! Nombre et stade à surveiller pour déterminer de la nécessité d'un traitement ! Attention car la pression eudémis est très ponctuelle : observez sur VOS parcelles !

NOTE : L'utilisation d'une barrière physique de type argile kaolinite calcinée, en plus de l'effet insectifuge, atténuera les dégâts dus à l'échaudage physiologique (voir p 2). Elle pourra aussi avoir un effet sur les tordeuses dans leur reconnaissance des sites de pontes (baies). Privilégier une application en plein et non centrée sur grappe pour une meilleure efficacité.

Attention : éviter l'argile au stade fermeture de grappe. De l'argile risquerait de se trouver enfermée dans la grappe et de relarguer de l'humidité plus tard dans la saison favorisant le botrytis.

↓ En images...



Esca forme lente



Black Dead Arm forme lente



Esca/BDA: apoplexie, forme rapide



Carence Manganèse



Chironome : Diptère nématocère, neutre



Enroulement : Phénomène « normal » pour limiter évapotranspiration de la Vigne



Cicadelle Bubale : Ponte/Piqûres créant un « Cal » Liégeux et la décoloration au dessus de la piqûre



Echaudage : Dégât sur vrille (desséchée)



Dégât échaudage sur feuilles



Chenille Lépidoptère : Lycaenidae



POUR ALLER PLUS LOIN...

Les informations ci-dessous ne sont valables que dans le respect des bonnes pratiques agronomiques et biologiques respectueuses du sol et de la plante, en intégrant autant que possible l'approche globale de son vignoble.

Préparations de phytothérapie et/ou biodynamie à utiliser actuellement

📄 Téléchargez [l'article phytothérapie](#) et cliquez sur lien (en vert) pour les [fiches par plante](#), ou demandez-les à vos techniciens

[Ortie](#) [Prêle](#) [Reine des prés](#) [Valériane](#) [Pissenlit](#) [Sauge](#) [Voir Bulletins Précédents](#)
(stress – rognage-éffeuillage)

Camomille

En Tisane à 10%, on utilise les fleurs seulement. Riche en Soufre, Calcium & Potassium. A un Rôle de régulation, en préventif et en accompagnement de la vigne pour de nombreuses maladies (notamment Mildiou). **Intéressant pour « humidifier » la vigne, notamment parcelle sensible échaudage (idem tisane Ortie).** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

Fougères

En Purin à 10 %, Préférez la Fougère Aigle (*Pteridium aquilinum*), à défaut la Fougère Mâle (*Dryopteris filixmas*). Action Insectifuge. Est utile contre les cicadelles vertes à conditions de renouveler vos traitements tous les 8-10 jours maximum, sinon pas d'efficacité. Ce sont les feuilles (frondes) que l'on prépare en purin. (1Kg de feuilles fraîches ou 100 g de sèches dans 10 litres d'eau).

Consoude

En Purin ou « pur jus », permet d'aider les plantes en situation de stress, aide à la fructification, permettrait de réduire les doses de soufre. Plante riche en fer, bore et potasse. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures. Intéressant aussi si rognage ou éffeuillage.**

Achillée

En Tisane (10%), on utilise la plante entière, Riche en Soufre, Sucre & Potasse. Aide à lutter contre la coulure & favorise la floraison. Contient également des huiles volatiles & de l'acide Salicylique, qui permettraient la réduction des doses de Soufre. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

501

Possible d'utiliser la 501, **entre 2 & 4g/ha**. Suivant la météo à venir, une ou plusieurs applications peuvent être envisagées après la Fleur, notamment pour renforcer la plante et stimuler ses défenses suite aux conditions météo (forte amplitude thermique, manque de luminosité et de chaleur, présence de maladies et notamment Mildiou). Possibilité d'ajouter quelques gouttes de valériane (507), en début de dynamisation, sauf si forte présence de mildiou. **A ne pas trop utiliser par temps lumineux et sec. Ne pas utiliser sur des vignes chétives.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#). **Contactez-nous si questions.**



LA POSITION DE LA LUNE

Prendre en compte la position de la lune dans mes travaux :

Lune montante jusqu'au **09/08**

et descendante jusqu'au **26/07**

Lune croissante jusqu'au **29/07**

et décroissante jusqu'au **12/08**

Pour repousse plus lente tondre les couverts en jours fleurs ou racines :

Lune descendante : **21 au 23 juillet**



Période favorable aux préparations préventives des **maladies** **30/07 & 05-09/08 (matin)**



Période favorable aux préparations préventives des **insectes** **30/07 & 07-10/08**



Période favorable limitant les germinations des **adventices** : **travail sous le rang** **22 juillet (matin) & 29-30 juillet**



Prochains **nœuds lunaires** **31/07 à 14h**



Prochain **périgée** **10/08 à 13h**

Éviter le travail des sols et de la plante pendant les nœuds lunaires (2 par mois) et la Lune en périgée (1 par mois).

N'hésitez pas à contacter votre technicien.ne-conseil pour toute information complémentaire.

CALENDRIER BIODYNAMIQUE ↓

Dates	Mer 22/07	Jeudi 23/07	Ven 24/07	Sam 25/07	Dim 26/07	Lun 27/07	Mar 28/07	
Jour								
Dessous rang								Jour fruit
Inter rang								Jour racine
Tonte couvert								Jour fleur
Epamprage- Effeillage- Rognage								Jour feuille

Le soleil est dans la constellation des Cancer et y restera jusqu'au 10/08 où il entrera dans celle du Lion.

Cueillette des plantes pour tisanes et préparations biodynamiques : se réalise au stade tout début floraison de la plante, le matin, par très beau temps en évitant les jours feuilles et le périgée et en favorisant les jours fleurs et l'apogée. Évitez aussi les bords de route très fréquentés ou trop pollués par l'activité humaine ou agricole. Pour les plantes à faire sécher, préférez la lune décroissante ET montante.

📄 Plus d'infos sur [la mise en œuvre de la biodynamie](#)

📄 Plus d'infos sur [l'approche du sol en biodynamie](#)

← [Retour au sommaire](#)

Note concernant la biodynamie : il faut d'abord respecter et maîtriser les règles de l'agronomie, de l'agriculture biologique et seulement ensuite la biodynamie peut apporter un plus à votre domaine et à vos vins. C'est pourquoi nous conseillons de se concentrer sur les fondamentaux cette année, le temps d'acquérir tout le matériel nécessaire et de mettre les vignes au propre, une fois cela fait on pourra envisager une évolution sereine vers la biodynamie.

Relevé météo, par secteur

	Du 14 juillet au 21 juillet					
	Températures (°C)			Précipitations (mm)		
	mini.	max.	Moyen.	mini.	max.	Cumul
Bergerac	18,4	38,2	27,5	0	4,7	5,6
Villefranche de Lonchat	16,4	36,2	26,1	0	0,1	0,1
Montcaret	15,8	36	26,2	0	15,2	15,8
Pineuilh	17,8	36,4	26,3	0	1,4	2,4
Saint Astier (47)	16,6	35,8	25,9	0	17,6	18,7
Sigoulès	17,6	35,8	26,1	0	3,8	6,3
Saint Jean de Duras (47)	17,6	36,4	26,1	0	5,4	5,9
Creysensac & Pissot	16,8	36,2	26	0	0,8	0,9

Prévisions météo à une semaine, par secteur

Précipitations en mm

0

< 4

< 15

> 15

Prévisions semaine à venir	Mer 22.07			Jeu 23.07			Ven 24.07			Sam 25.07			Dim 26.07			Lundi 27.07		
	Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations		
	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)
Bergerac	20	35	-	17	35	-	16	37	-	20	31	-	16	22	2,1	16	30	-
Villefranche de Lonchat	18	34	-	17	35	-	16	38	-	20	32	-	18	25	-	18	32	0,3
Montcaret	18	35	-	17	35	-	15	38	-	20	32	-	18	25	-	17	32	0,3
Pineuilh	19	34	-	17	36	-	16	38	-	20	32	0,3	18	27	-	17	32	0,3
Saint Astier	19	34	-	17	35	-	16	38	-	20	32	0,9	18	27	-	17	32	0,3
Sigoulès	18	34	-	17	35	-	16	37	-	20	32	1,5	18	27	-	17	32	0,3
Saint Jean de Duras	19	35	-	18	36	-	16	36	-	20	31	0,6	17	22	2,4	16	30	-
Creysensac & Pissot	19	34	-	17	34	-	16	35	-	20	30	0,6	16	22	2,4	14	30	-



FOCUS TECHNIQUE

Point Stratégie : Quand Basculer ?

De quoi s'agit-il ? En vigne on applique 2 stratégies différentes :

- Du débourrement à Fermeture de la Grappe (FG) : Stratégie « accompagnement de la pousse ». Le lessivage est limite secondaire... C'est la stratégie qui concentre le plus de traitements.
- De fermeture de la grappe à maturité : Stratégie « Lessivage ». On attend que le dernier traitement ait été lessivé ET de nouvelles pluies pour renouveler un traitement. C'est la stratégie qui permet de limiter le nombre de traitements.

Rappel sur le basculement de stratégie : Si la vigne a atteint sa surface foliaire & surface grappes maximum (càd que stade FG) atteint & que tous les entre-cœurs sont sortis et peuvent être éliminés à la rogneuse) : Si ET Seulement si, ces 2 conditions sont réunies : On peut basculer de stratégie : càd, On arrête de suivre la pousse & on renouvelle en fonction du lessivage. **IL EST IMPERATIF DE MAINTENIR LA SURVEILLANCE, notamment sur le Black Rot & l'Oïdium avec cette stratégie.**

Les nouvelles pousses qui pourraient être contaminées par la pluie seront éliminées avec la rogneuse, si les parcelles ont bien acquis leur palissage maximum. Tout en veillant à ne pas créer de blessures sur les grappes.

En cas d'apparition d'oïdium, on pourra effectuer un soufre fleur en poudrage, à 20 Kg/ha, qui a de bons effets curatifs sur les tous 1^{ers} symptômes. Si parcelle avec historique important, et que vous ne souhaitez pas traiter préventivement avec pulvérisateur, possible de réaliser poudrage, même dose mais avec un soufre « Trituré » (moins effet choc, mais rémanence plus importante). Attention si vous faites un poudrage, ne pas associer à de l'argile tant que stade FG pas totalement atteint (risque d'augmenter l'hygrométrie à l'intérieur de la grappe, à cause de argile « emprisonné »...)

- **Détails Stratégies et Options : Voir Page 2**
- Les doses de cuivre métal, seront à adapter en fonction du niveau de pression passée et au moment des traitements, ces points là feront l'occasion de précisions/adaptations dans les prochains bulletins.

Parcelles avec symptômes d'Oïdium / Black Rot marqués : Augmenter la dose de soufre pur à 6-8 Kg. Suivant année, historique, etc. à partir de fermeture de la grappe, suivant état phytosanitaire, niveaux de risques, on pourra réduire, sur de nombreuses parcelles. Pour cette année il est trop tôt pour décider arrêter soufre, mais à voir d'ici 10-15 jours, vu faibles niveaux actuels du Black Rot et de l'Oïdium. **En cas de forte attaque de Black Rot : Resserrez les cadences et ne plus faire d'impasse !! N'hésitez pas à nous contacter pour optimiser vos stratégies !!!**

Note sur les baies millerandées : Attention aux baies millerandées, qui vont rester vertes plus longtemps et se développer plus lentement, donc rester très sensibles à l'Oïdium et au Mildiou (Actuellement, pas de sortie sur ces organes). Ce phénomène est assez marqué cette année sur de nombreuses parcelles ; Il faut maintenir la vigilance (sans s'alarmer).

Jusqu'à la fin de saison : Suivant évolution des symptômes sur le haut du feuillage, privilégiez un rognage court (de manière à éliminer un maximum de feuilles contaminées & à favoriser l'émergence de nouvelles pousses dans un environnement sain !! **Attention à rogner, dès premier passage, assez haut par rapport dernier fil (suivant votre palissage) afin de garder une marge de manœuvre, en fin de saison. En fin de saison :** Attention à ne pas rogner des bois aoûtés !!

RAPPEL : Jusqu'à fermeture de la grappe / 1^{ers} rognages – palissage maximum, la PRIORITE sera l'ACCOMPAGNEMENT de la POUSSE et NON LE LESSIVAGE ! Traitez toujours : Avant la pluie ET au plus proche de la pluie, de manière à couvrir au maximum la pousse. Cette année, les épisodes de canicules peuvent bloquer transitoirement le développement de la vigne. Il est possible que certaines parcelles n'atteignent pas ces 2 caractéristiques ; sur ces dernières il faudra continuer d'accompagner la pousse. Si parcelles où la vendange est déjà fortement compromise, limiter les charges et se focaliser à maintenir le feuillage sain pour permettre un bon aoûtement des bois, une bonne mise en réserve et pouvoir commencer 2026 sur de bonnes bases !

Veillez à ne pas appliquer le soufre conjointement à de fortes températures : risques de brûlures sur feuilles et baies !!!

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter vos technicien.ne.s !



FOCUS TECHNIQUE

Point Flavescence Dorée :

Infos prospection publiées par le GDON, Bulletin N°2, juin 2026 :

PROSPECTION

La prospection du vignoble : son importance dans la lutte contre la Flavescence dorée est majeure, à plusieurs titres :

- Elle permet de repérer les pieds extériorisant des symptômes et de les arracher de manière à supprimer le réservoir de phytoplasme (micro-organisme responsable de la maladie). Ainsi la progression de la maladie est fortement limitée ;
- La prospection collective permet aussi de surveiller la progression de la maladie sur le territoire, d'adapter la lutte, et d'éviter l'apparition de foyers important nécessitant l'arrachage de parcelles entières ;
- La prospection collective réalisée par le GDON est aussi la seule prise en compte par l'administration pour faire évoluer le périmètre de la zone délimitée et de faire diminuer le nombre de traitements par commune. De plus elle est obligatoire pour les communes où le scénario alternatif est mis en place.

Cette année la prospection sera réalisée par des techniciens en quad et un groupe de techniciens à pied sur les communes suivantes :

BERGERAC	RAZAC-D'EYMET
CARSAC-DE-GURSON	RIBAGNAC
COLOMBIER	ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES
CONNÉ-DE-LABARDE	SADILLAC
CREYSSE ⁽¹⁾	SAINT-AUBIN-DE-CADELECH
FOUGUEYROLLES	SAINT-AUBIN-DE-CADELECH
LAMONZIE-SAINT-MARTIN	SAINT-CAPRAISE-D'EYMET
LEMBRAS	SAINT-CYPRIEN
MESCOULES	SAINT-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE
MONBAZILLAC	SAINT-SEURIN-DE-PRATS section cadastrale B
MONESTIER	SAINT-VIVIEN
MONTAZEAU	SAUSSIGNAC
MONTPEYROUX	SIGOULES-ET-FLAUGEAC
NASTRINGUES	THENAC
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT ⁽²⁾	VELINES
PRIGONRIEUX	VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT
RAZAC-DE-SAUSSIGNAC	

Légende :

(1) sections cadastrales AV, AD, AE, AA, AC0002, AC0003, AC0016, AC0017

(2) sections cadastrales AH, ZB, AE, AT, AV, AO0007 à AO0011, AO0137, AM0030 à 0035 et 0040, 0094 à 0100

DURAS
LOUBES-BERNAC
SAINT-ASTIER
SOUSENSAC
SAUVETAT-DU-DROPT

La prospection sera réalisée à partir de début août 2026. Vous serez amenés à rencontrer les prospecteurs dans vos vignes durant cette période. Merci de leur réserver le meilleur accueil, comme à votre habitude !

Saison 2026 - GDON DU BERGERACOIS Pôle Viticole ZA Vallade Sud 24112 BERGERAC Cedex

Pour plus de précisions, contactez Cathy Lourtet : 05 53 24 55 44 ou 06 84 80 54 49 - cathy.lourtet@fvbd.fr .



HISTORIQUE – RÉSEAU DE SURVEILLANCE


Données issues du réseau de piégeage et de surveillance d'AgroBio Périgord

Données mises à jour le : **21/07/2026**


11 Participants, 21 pièges en 2026

Graphiques synthétisant les principales données de 2026 :

Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Eudémis



Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Cicadelles Vertes



NOUS CONTACTER



Réseau de surveillance ·
Conseil et formations tailles-
greffage-curetage · Réseau
DEPHY-ECOPHYTO ·

c.maisonneuve@agrobioperigord.fr
07 88 02 29 38



Conseil et formations bio
biodynamiques · Coordination
expérimentations · Référent
viticulture biologique pour la
FNAB et l'ITAB ·

e.maille@agrobioperigord.fr
06 87 58 48 50

NOS PARTENAIRES RÉSEAU



NOS RÉSEAUX SOCIAUX

[YouTube](#)

[Groupe Facebook Viti AgroBio Périgord](#)

Parce que...

- ✓ Je soutiens **une agriculture bio et locale en Dordogne**
- ✓ Je veux faire partie d'un réseau de **plus de 650 adhérents**
- ✓ Mon adhésion est **essentielle** pour la vie du réseau et permet de **peser sur les politiques publiques** liées à la bio (aides...)

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION

L'adhésion en ligne en 5 min, c'est par [ici](#) !



• **AGROBIO PÉRIGORD** •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

Ou télécharger le
[bulletin d'adhésion](#)
[papier](#)

Note : sur présentation de votre justificatif d'adhésion, VBNA (Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine) applique une remise de 40 € à votre cotisation !

Nouvelle
ADRESSE

AgroBio Périgord
Pôle Pomport (viticulture)
Route du Lac
24240 POMPORT

Nous partageons les locaux avec les
Vignerons Indépendants de Dordogne

Cette action est réalisée grâce à nos adhérents.

Avec le soutien financier de :

