



• AGROBIO PÉRIGORD •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

➔ **Mardi 28 juillet 2026**

Viticulture bio

BULLETIN TECHNIQUE N°11

PROCHAIN BULLETIN :
Mardi 11 août

PROCHAIN INTER-BULLETIN :
Mardi 4 août

Du côté
des maladies

P 2

Du côté
des insectes

P 3

Pour aller plus loin...
La position de la Lune

P 5

Focus
Météo

P 4

Focus
technique

P 6

Historique
Réseau de surveillance

P 8

Événements à venir

SAVE THE DATE : mercredi 29 juillet 9h-11h : Fertilité des sols viticoles avec Florian Bassini
Château le Payral, Le Bourg, Razac de Saussignac
Inscriptions sur le site

SAVE THE DATE : jeudi 30 juillet (secteur Ouest) et vendredi 31 juillet (secteur sud) : conseil collectif mobile G3 d'eudémis
Lieu : à venir (selon participants)
Inscriptions : c.maisonneuve@agrobioperigord.fr 07 88 02 29 38

OBSERVATIONS

La sécheresse et les fortes chaleurs persistantes continuent d'accentuer la souffrance sévère de la vigne.

Des symptômes variés (carences, jaunissements, dessèchements, ESCA/BDA, brûlures de baies) continuent de progresser, la véraison aussi.

La situation s'aggrave particulièrement dans les parcelles à risque (sols filtrants, faible réserve hydrique, jeunes vignes) n'ayant pas bénéficié des dernières pluies, qui ont été que trop faibles (10mm en cumul maxi).

Stade moyen du vignoble : mi véraison

Stades



35 - Début véraison



37 - Fin véraison

Stades observés : de début véraison à fin véraison



POINT MÉTÉO

Après cette légère baisse des températures, celles-ci remontent dès aujourd'hui pour les prochains jours, nous plongeant à nouveau dans un épisode caniculaire. jusqu'à mardi prochain.

Un épisode orageux est probable selon certains modèles météo ce vendredi, ce qui entrainerait une baisse des températures la semaine prochaine.

Ces probabilités de précipitations sont à ce jour moyennes. Restez vigilant.

Moyenne / 20ans : Déficit hydrique des 30 derniers jours : 59% (-26 mm) Déficit hydrique des 12 derniers mois : 5 % (-32 mm)





DU CÔTÉ DES MALADIES

Transfert de connaissances

Mildiou

[Fiche INRAe, Cliquez ici](#)

Risque

Faible à très faible

TNT au 23/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 1 %

Fréquence : 1 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

La situation sanitaire est globalement stable et saine pour l'ensemble des maladies fongiques. Les niveaux de risques fongiques vis-à-vis de la récolte sont très faibles à nuls. Seules quelques parcelles sont concernées par la surveillance de l'état sanitaire du feuillage concernant des contaminations par du mildiou mosaïque. Toutefois, les conditions climatiques à venir demeurent défavorables à une extension notable des symptômes en cours..(Source BSV –n°18– Edition Nord Aquitaine - 29/07/2026).

Oïdium

[Fiche INRAe, Cliquez ici](#)

Risque

Faible à Moyen

TNT au 23/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

La situation sanitaire est globalement stable et saine pour l'ensemble des maladies fongiques. Les niveaux de risques fongiques vis-à-vis de la récolte sont très faibles à nuls. Seules quelques parcelles sont concernées par la surveillance de l'état sanitaire du feuillage concernant des contaminations par du mildiou mosaïque. Toutefois, les conditions climatiques à venir demeurent défavorables à une extension notable des symptômes en cours..(Source BSV –n°18– Edition Nord Aquitaine - 29/07/2026).

Black Rot

[Fiche INRAe, Cliquez ici](#)

Risque

Fort à Très fort

TNT au 23/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

La situation sanitaire est globalement stable et saine pour l'ensemble des maladies fongiques. Les niveaux de risques fongiques vis-à-vis de la récolte sont très faibles à nuls. Seules quelques parcelles sont concernées par la surveillance de l'état sanitaire du feuillage concernant des contaminations par du mildiou mosaïque. Toutefois, les conditions climatiques à venir demeurent défavorables à une extension notable des symptômes en cours..(Source BSV –n°18– Edition Nord Aquitaine - 29/07/2026).

Botrytis

[Fiche INRAe, Cliquez ici](#)

Risque

Nul

TNT au 23/06 St Jean de Duras



Feuilles

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %



Baies

Intensité : 0 %

Fréquence : 0 %

Le risque est toujours nul : pas de nouveaux symptômes observés sur feuilles (en général suite blessures, vents, palissage, matériel, etc.), aucun symptôme sur grappes dans notre réseau. Les conditions actuelles sont défavorables à son développement. *Le meilleur anti botrytis reste toujours la prophylaxie.*

CONSEILS

Traitement : ont basculées en mode "lessivage", donc c'est surtout les pluies reçues ou non ET le niveau de risque qui vont définir votre stratégie, les parcelles lessivées devront absolument être recouvertes avant les prochaines pluies.

- Parcelles avec feuillage sain & vendanges précoces : si actuellement couvert => arrêt de la protection. Privilégiez la prophylaxie
- Parcelles avec feuillage sain & vendange tardives : attendre, privilégiez la prophylaxie & éventuellement veillez à être recouvert avant de nouvelles pluies (si présence de nombreuses jeunes feuilles) avec un sulfate et/ou Hydroxyde 150 – **200** g Cu métal
- Parcelles feuillage attaqué par le mildiou, traitez avant toute pluie > 10 mm avec sulfate et/ou hydroxyde 200 – **300** g Cu métal

Attention à ne pas trop forcer avec le soufre avec les T° élevées (> 28 °C) . Possible d'arrêter le soufre si pas de passif Black Rot ou Oïdium, et à condition de maintenir une surveillance. Si besoin nous contacter.

NOTES



Priorités INCHANGEES !!! Suivant pousse & lessivage : possibilités de basculer en mode « lessivage » ou recouvrir avant prochaines pluies...

En l'absence de pluie, si pas de traitement, maintenez une vigilance accrue de vos parcelles !!!

Entretien du sol :

Sous le rang :

Priorité : Eviter que les adventices ne gênent la qualité de pulvérisation !!!

Voir bulletins précédents... La plupart des domaines ont profité du temps des dernières semaines pour ce mettre à jour.

Inter-rang :

Si croûte de battance, remettre en porosité par un griffage superficiel. De plus cela permettra de stimuler la minéralisation du sol et permettra de satisfaire les besoins de la vigne en Azote [\[cliquer ici\]](#).

Epamprage / Ebourgeonnage :

Surveiller repousses. Passage si nécessaire.

Relevages :

Normalement les vignes sont à jour, les chantiers suivent la pousse... Toujours prioritaire avant prochaines pluies et prochain traitement !!!
Rappel : voir bulletins précédents.

Rognage : En cours ou déjà fait sur parcelles précoces et/ou vigoureuses. Sauf urgence, évitez de rogner lors des épisodes de fortes chaleurs (>35°C).

Pour éviter du stress à la vigne et avoir de meilleur débit de chantier/résultats. Pensez à Rogner malin...

Plus d'infos ? Cliquez Ici!

Echaudage : Toujours d'actualité, notamment si parcelle à risque vu le nouveau pic de chaleur annoncé. Il est possible d'utiliser de [l'argile kaolinite calcinée](#) ou de l'hydroxyde de calcium comme barrière physique. Dosage : 15-20kg/ha pour 200 à 250L/ha de bouillie = 5-7%. Privilégiez les grosses gouttes pour éviter leur évaporation avant d'avoir atteint le feuillage. Privilégier les faces Ouest et Sud. [Carte des distributeurs](#) en Dordogne et limitrophes.

Maladies du Bois : hausse des symptômes d'Esca et de Black Dead Arm, possible de mettre à profit période plus « calme » **pour sauver des pieds !!**

Plus d'infos cliquez ici



Téléchargez **le point infos** sur la prophylaxie



Relevé météo, par secteur

	Du 21 juillet au 28 juillet					
	Températures (°C)			Précipitations (mm)		
	mini.	max.	Moyen.	mini.	max.	Cumul
Bergerac	14,8	37,6	24	0	3	3,3
Villefranche de Lonchat	13,8	36,8	22,9	0	8,1	8,6
Montcaret	13,2	36,8	23,2	0	2,1	2,3
Pineuilh	15,2	36,6	23,3	0	0,8	1,6
Saint Astier (47)	14,2	36,8	23	0	1,4	2,2
Sigoulès	13,8	36,6	22,8	0	0,3	0,6
Saint Jean de Duras (47)	15,4	36,8	23,3	0	0,5	0,9
Creysensac & Pissot	16,4	36,4	22,8	0	8,3	9,7

Prévisions météo à une semaine, par secteur

Précipitations en mm

0

< 4

< 15

> 15

Prévisions semaine à venir	Mer 29.07			Jeu 30.07			Ven 31.07			Sam 01.08			Dim 02.08			Lundi 03.08		
	Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations		
	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)
Bergerac	18	41	-	20	32	0,1	19	27	1,2	20	37	1,8	15	34	-	15	36	-
Villefranche de Lonchat	19	41	-	19	31	0,2	18	27	1,8	19	35	-	15	33	-	15	35	-
Montcaret	17	41	-	20	31	0,1	18	27	1,8	19	35	-	15	34	-	15	36	-
Pineuilh	18	41	-	20	31	-	18	27	1,8	19	35	0,9	15	34	-	15	36	-
Saint Astier	20	41	-	19	31	-	18	26	2,4	19	36	2,1	15	34	-	15	36	-
Sigoulès	19	40	-	19	32	0,2	18	27	1,8	20	37	2,4	15	34	-	15	36	-
Saint Jean de Duras	20	41	-	19	31	-	18	27	2,4	19	36	3	15	34	-	16	36	-
Creysensac & Pissot	19	39	-	19	32	-	18	26	2,7	20	37	0,9	14	33	-	15	35	-



DU CÔTÉ DES INSECTES

Transfert de connaissances

Cicadelle FD

Pas d'observation de stades larvaires cette semaine. Quelques captures d'adultes sur le réseau. Rognez en dernier les parcelles présentant des symptômes ou ayant eu des pieds infectés détectés l'an dernier par la prospection. Réseau : Mini : 0 / max : 2 / moy : 0.6 adulte/sem *Légère augmentation*. **Prophylaxie** : Toutes les informations en [cliquant ici](#). Soyez attentifs à l'apparition de symptômes. Ne supprimez pas les organes porteurs de symptômes pour ne pas gêner la prospection ! (cela n'empêchera pas les contaminations).

Tordeuses

Le vol de G3 est en augmentation et se généralise : Mini : 0 / max : 38 / moy : 13.8 adulte/sem. Après les pontes apparues en secteur Ouest la semaine dernière c'est au tour du secteur Sud avec Monbazillac et Eymet. Nombre et stades à surveiller pour déterminer les dates de traitement si nécessaire. Seuil de déclenchement à 5 pontes pour 100 grappes et au plus proche des stades tête noire. Avec les fortes températures, les stades évolueront vite, mais on a aussi dessèchement de certaines pontes. *Moyenne pontes 12.5 pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 44. Forte augmentation*. **Des perforations vides de G2 en cours de dessèchement**: *Moyenne perfos 14.9 pour 100 grappes, Mini : 0 / Max : 112 Augmentation*.

Cicadelles vertes

En attente du troisième vol. Pas de larves observées cette semaine. Rares dégâts sur feuilles. Réseau : Mini : 0 / max : 3 / moy : 0.9 adulte/sem *Légère augmentation*. *Moyenne 0 Larves pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 0 Diminution*. *Moyenne 0% Dégâts pour 100 feuilles, Mini : 0 / Max : 0.1% Stable*.

NOTES

Biodiversité et auxiliaires : Rappels et Détails voir bulletins précédents.

Les populations de ravageurs restent faibles (notamment cicadelles), à l'exception du troisième vol d'eudémis ! On constate toujours la présence de certains auxiliaires tels que les araignées (particulièrement nombreuses en ce moment), les punaises (dont *diabolique*), quelques syrphes et coccinelles, des papillons... Baisse de la présence des larves de *Zygina rharni*, mais on trouve plus régulièrement des traces de ses dégâts sur feuilles qui restent négligeables. Avec les fortes températures, elle prend le pas sur la cicadelle verte car davantage thermophile. Retour également des chrysopes adultes et présence d'œufs.

Erinose : Très faible présence cette année, pour l'instant, rares nouveaux symptômes sur feuilles, sans gravité.

Galle phylloxérique : quelques nouveaux symptômes intenses sur jeunes feuilles, mais sans gravité.

Enherbement : 2 questions à se poser avant de sortir le gyrobroyeur : 1) Est-ce que le couvert gêne la qualité de pulvérisation ? 2) Est-ce que le couvert maintien une hygrométrie favorable à la maladie ? – Si vous répondez « Non » à ces 2 questions = Pas de tonte !!! Vu la météo actuelle, laissez les couverts à paille, ne surtout pas les tondre si possible ou alors à au moins 8-10 cm

CONSEILS

CFD : UNIQUEMENT pour la Dordogne et Lot & Garonne : Tous les traitements sont terminés !!! [Cliquez Ici](#). **RAPPEL** : Les messages des GDON pour traitement **ALDUTICIDES NE CONCERNENT PAS** les utilisateurs de **Pyrèthres naturel**.

Eudémis : APPARITION DES PONTES DE G3 !!! Nombre et stade à surveiller pour déterminer de la nécessité d'un traitement ! Attention car la pression eudémis est très ponctuelle : observez sur VOS parcelles ! La question doit se poser à partir de 5 pontes pour 100 grappes (coef *3-*4 pour approcher la réalité) et de la destination de vos vins : point info tordeuse en fin de bulletin !

NOTE : L'utilisation d'une barrière physique de type argile kaolinite calcinée, en plus de l'effet insectifuge, atténuera les dégâts dus à l'échaudage physiologique (voir p 2). Elle pourra aussi avoir un effet sur les tordeuses dans leur reconnaissance des sites de pontes (baies). Privilégier une application en plein et non centrée sur grappe pour une meilleure efficacité.

Attention : éviter l'argile au stade fermeture de grappe. De l'argile risquerait de se trouver enfermée dans la grappe et de relarguer de l'humidité plus tard dans la saison favorisant le botrytis.

↓ En images...



Attaque de fourmis : en recherche d'eau



Dégâts fourmis : résultats propres !



Éclosions Punaises Diaboliques



Cicadelle Bubale : Rare, ponte sur rafle = grappe flétrit



Cicadelle Bubale : Détail, ponte/Piqûres créant un « cale légers » sur rafle



Évitez de laisser aoûter les pampres : Consomment les réserves & risque de blessures



Cicadelle Platymetopius : neutre



Tordeuse de l'œillet : neutre



Sauterelle verte



Une autre sauterelle



POUR ALLER PLUS LOIN...

Les informations ci-dessous ne sont valables que dans le respect des bonnes pratiques agronomiques et biologiques respectueuses du sol et de la plante, en intégrant autant que possible l'approche globale de son vignoble.

Préparations de phytothérapie et/ou biodynamie à utiliser actuellement

📄 Téléchargez [l'article phytothérapie](#) et cliquez sur lien (en vert) pour les [fiches par plante](#), ou demandez-les à vos techniciens

[Ortie](#) [Prêle](#) [Reine des prés](#) [Valériane](#) [Pissenlit](#) [Sauge](#) [Voir Bulletins Précédents](#)
(stress – rognage-éffeuillage)

Camomille

En Tisane à 10%, on utilise les fleurs seulement. Riche en Soufre, Calcium & Potassium. A un Rôle de régulation, en préventif et en accompagnement de la vigne pour de nombreuses maladies (notamment Mildiou). **Intéressant pour « humidifier » la vigne, notamment parcelle sensible échaudage (idem tisane Ortie).** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

Fougères

En Purin à 10 %, Préférez la Fougère Aigle (*Pteridium aquilinum*), à défaut la Fougère Mâle (*Dryopteris filixmas*). Action Insectifuge. Est utile contre les cicadelles vertes à conditions de renouveler vos traitements tous les 8-10 jours maximum, sinon pas d'efficacité. Ce sont les feuilles (frondes) que l'on prépare en purin. (1Kg de feuilles fraîches ou 100 g de sèches dans 10 litres d'eau).

Consoude

En Purin ou « pur jus », permet d'aider les plantes en situation de stress, aide à la fructification, permettrait de réduire les doses de soufre. Plante riche en fer, bore et potasse. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures. Intéressant aussi si rognage ou éffeuillage.**

Achillée

En Tisane (10%), on utilise la plante entière, Riche en Soufre, Sucre & Potasse. Aide à lutter contre la coulure & favorise la floraison. Contient également des huiles volatiles & de l'acide Salicylique, qui permettraient la réduction des doses de Soufre. **Intéressant pour « rafraîchir » la vigne, mieux supporter variations températures.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#)

501

Possible d'utiliser la 501, **entre 2 & 4g/ha**. Suivant la météo à venir, une ou plusieurs applications peuvent être envisagées après la Fleur, notamment pour renforcer la plante et stimuler ses défenses suite aux conditions météo (forte amplitude thermique, manque de luminosité et de chaleur, présence de maladies et notamment Mildiou). Possibilité d'ajouter quelques gouttes de valériane (507), en début de dynamisation, sauf si forte présence de mildiou. **A ne pas trop utiliser par temps lumineux et sec. Ne pas utiliser sur des vignes chétives.** Plus d'infos : [Cliquez Ici](#). **Contactez-nous si questions.**



LA POSITION DE LA LUNE

Prendre en compte la position de la lune dans mes travaux :

Lune montante jusqu'au **09/08**

et descendante jusqu'au **22/08**

Lune croissante jusqu'au **29/07**

et décroissante jusqu'au **12/08**

Pour repousse plus lente tondre les
couverts en jours fleurs ou racines en :

Lune descendante : **09 août & 15 au 19 août**



Période favorable aux préparations
préventives des **maladies** **30/07 & 05-09/08 (matin)**



Période favorable aux préparations
préventives des **insectes** **30/07 & 07-10/08**



Période favorable limitant les
germinations des **adventices** : **29-30 juillet**
travail sous le rang



Prochains **nœuds lunaires** **31/07 à 14h**



Prochain **périgée** **10/08 à 13h**

**Éviter le travail des sols
et de la plante pendant
les nœuds lunaires (2 par
mois) et la Lune en
périgée (1 par mois).**

N'hésitez pas à contacter
votre technicien.ne-
conseil pour toute
information
complémentaire.

CALENDRIER BIODYNAMIQUE ↓

Dates	Mer 29/07	Jeudi 30/07	Ven 31/07	Sam 01/08	Dim 02/08	Lun 03/08	Mar 04/08	
Jour								
Dessous rang								Jour fruit
Inter rang								Jour racine
Tonte couvert								Jour fleur
Epamprage- Effeuilage- Rognage								Jour feuille

Très favorable
↓
Très défavorable

Le soleil est dans la constellation des Cancer et y restera jusqu'au 10/08 où il entrera dans celle du Lion.

Cueillette des plantes pour tisanes et préparations biodynamiques : se réalise au stade tout début floraison de la plante, le matin, par très beau temps en évitant les jours feuilles et le périgée et en favorisant les jours fleurs et l'apogée. Évitez aussi les bords de route très fréquentés ou trop pollués par l'activité humaine ou agricole. Pour les plantes à faire sécher, préférez la lune décroissante ET montante.

📄 Plus d'infos sur [la mise en œuvre de la biodynamie](#)

📄 Plus d'infos sur [l'approche du sol en biodynamie](#)

← [Retour au sommaire](#)

Note concernant la biodynamie : il faut d'abord respecter et maîtriser les règles de l'agronomie, de l'agriculture biologique et seulement ensuite la biodynamie peut apporter un plus à votre domaine et à vos vins. C'est pourquoi nous conseillons de se concentrer sur les fondamentaux cette année, le temps d'acquiescer tout le matériel nécessaire et de mettre les vignes au propre, une fois cela fait on pourra envisager une évolution sereine vers la biodynamie.

Relevé météo, par secteur

	Du 21 juillet au 28 juillet					
	Températures (°C)			Précipitations (mm)		
	mini.	max.	Moyen.	mini.	max.	Cumul
Bergerac	14,8	37,6	24	0	3	3,3
Villefranche de Lonchat	13,8	36,8	22,9	0	8,1	8,6
Montcaret	13,2	36,8	23,2	0	2,1	2,3
Pineuilh	15,2	36,6	23,3	0	0,8	1,6
Saint Astier (47)	14,2	36,8	23	0	1,4	2,2
Sigoulès	13,8	36,6	22,8	0	0,3	0,6
Saint Jean de Duras (47)	15,4	36,8	23,3	0	0,5	0,9
Creysensac & Pissot	16,4	36,4	22,8	0	8,3	9,7

Prévisions météo à une semaine, par secteur

Précipitations en mm

0

< 4

< 15

> 15

Prévisions semaine à venir	Mer 29.07			Jeu 30.07			Ven 31.07			Sam 01.08			Dim 02.08			Lundi 03.08		
	Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations			Températures & précipitations		
	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)	mini. (°C)	max. (°C)	Pluv. (mm)
Bergerac	18	41	-	20	32	0,1	19	27	1,2	20	37	1,8	15	34	-	15	36	-
Villefranche de Lonchat	19	41	-	19	31	0,2	18	27	1,8	19	35	-	15	33	-	15	35	-
Montcaret	17	41	-	20	31	0,1	18	27	1,8	19	35	-	15	34	-	15	36	-
Pineuilh	18	41	-	20	31	-	18	27	1,8	19	35	0,9	15	34	-	15	36	-
Saint Astier	20	41	-	19	31	-	18	26	2,4	19	36	2,1	15	34	-	15	36	-
Sigoulès	19	40	-	19	32	0,2	18	27	1,8	20	37	2,4	15	34	-	15	36	-
Saint Jean de Duras	20	41	-	19	31	-	18	27	2,4	19	36	3	15	34	-	16	36	-
Creysensac & Pissot	19	39	-	19	32	-	18	26	2,7	20	37	0,9	14	33	-	15	35	-



FOCUS TECHNIQUE

Point Vers de la Grappe :

Rappel sur les produits :

2 principaux Produits :

Spinosad : nom commercial : Success 4 ou Musdo 4 ou Fycilia (*attention concentration différente des 2 autres*)

- Le fabricant met en avant une action ovicide, mais le traitement est bien conseillé au stade tête noire de l'œuf (24h avant éclosion, comme un Bt) ce qui laisse supposer que l'essentiel de l'efficacité se fasse comme pour le Bt c'est à dire par ingestion.
- Action par contact et ingestion sur les chenilles (âge des chenilles tuées : jusqu'à 7 jours)
- **Persistance d'action** 12-14 jours
- **DAR** : 14 jours, ZNT : 20m, DRE : 6 h
- **Nombre d'application max** : 2
- **Résistance au lessivage** : jusqu'à 20-30 mm dans les bonnes conditions (produit translaminaire) – **uniquement sur dérogation en Demeter !**

Liste des Produits Spinosad : Cliquez sur le lien ci -contre : <https://ephy.anses.fr/substance/spinosad>

Bacillus thuringiensis : nombreuses spécialités

- Pas d'action ovicide
- Action par ingestion sur les chenilles à leur éclosion (âge des chenilles tuées : 1 jour)
- **Persistance d'action** : 8-10 jours
- **Délai Avant Récolte (DAR)** : 3 jours, ZNT : 5m, DRE : 6 h à 24 h
- **Nombre d'application variable** (de 4 à 12 suivant les spécialités commerciales)
- **Résistance au lessivage** : jusqu'à 15 mm

Liste des *Bacillus thuringiensis* : cliquez sur les liens ci-dessous (Principaux produits commerciaux, attention certains ont plusieurs noms commerciaux) :

<https://ephy.anses.fr/ppp/agree-50-wg#usages>

<https://ephy.anses.fr/ppp/costar-wg#usages>

<https://ephy.anses.fr/ppp/delbacileti#usages>

<https://ephy.anses.fr/ppp/delfin#usages>

<https://ephy.anses.fr/ppp/delfin#usages>

<https://ephy.anses.fr/ppp/lepinox-plus#usages>

<https://ephy.anses.fr/ppp/rapax-as#usages>

<https://ephy.anses.fr/ppp/xentari#usages>

Stratégie :

La stratégie vis-à-vis d'Eudémis peut se décliner de différentes façons sur un domaine, c'est à dire que plusieurs stratégies peuvent co-exister.

Si vous utilisez une barrière minérale, type argile kaolinite calcinée en préventif, c'est les captures de vos pièges qui vous feront déclencher vos traitements.

Dans tous les autres cas, c'est l'observation des pontes qui vous permettra de définir si :

- Il y a besoin de traiter, on peut se poser la question à partir de 5 pontes pour 100 grappes (on peut multiplier cette observation par 3 à 4 pour avoir une idée de la pression réelle),
- S'il faut traiter rapidement car le stade des œufs est très avancé ou si cela peut attendre quelques jours.




FOCUS TECHNIQUE

Point Vers de la Grappe :

Rappel sur les tordeuses et stratégies :

Graphique représentant la durée d'incubation des œufs des vers de la grappe en fonction de la température :



Source BSV : Les données pour réaliser ce graphique sont issues du livre « Ravageurs de la vigne, éditions Féret, 2008 ».



De gauche à droite : **ponte fraîche de tordeuse, ponte de tordeuse stade « jaune », ponte de tordeuse stade « tête noire », ponte de tordeuse éclos, et dégât de tordeuse (G2) : perforation** (Photos : Eric MAILLE)

- La littérature, cite souvent le stade « tête noire » (on voit la tête de la chenille, par transparence de l'œuf) pour positionner les traitements Spinosad ou Bt, cependant cela reste très théorique. En pratique, il faut souvent trouver un compromis. Le stade jaune peut en être un, cela peut aussi être votre tolérance vis-à-vis d'eudémis.
- Autre point important : La destination du vin. Quel marché ? Quelle valorisation ? Quelles exigences qualitatives sur le produit ? Les traitements contre les vers de la grappe sont onéreux et chronophages, et il est donc important de raisonner leur utilisation en fonction des critères ci-dessus. Par exemple, on peut ne pas traiter tout le parcellaire et/ou ne pas renouveler les traitements sur l'ensemble du vignoble.
- Si les vendanges ne sont pas trop précoces, on utilisera un Spinosad (*DAR 14 jours et bonne tenue au lessivage; non homologué Demeter*) en premier et on effectuera des renouvellements si nécessaire avec des Bt (*DAR 3 jours, sensibles au lessivage*).
- Même si traitement non lessivé, on considère qu'un Spinosad ne sera plus efficace au bout de 12-14 jours et un Bt au bout de 8-10 jours.
- **Dernier point : La confusion sexuelle ne doit pas interdire de surveiller les pontes dans son vignoble !!**



FOCUS TECHNIQUE

Point Vers de la Grappe :

Rappel sur les tordeuses et stratégies :

Les produits insectifuges :

Bien que le vol soit déjà commencé, des traitements insectifuges peuvent encore être réalisés dans les secteurs à forte pression où le vol est toujours en cours à l'aide d'argile kaolinite calcinée à 30 kg/ha (à renouveler 1 fois). Pour le moment, le nombre de pontes n'indique pas la nécessité d'un traitement insecticide, à moduler selon les parcelles. Le secteur ouest semble plus précoce et les populations y sont plus importante, à surveiller

Rappel sur les différents produits testés par Agrobio Périgord (synthèse essais eudémis 2021) :

BT	Spinosad	Confusion sexuelle (Rak)	AKC	V23	Saccharose et miel
40€/ha 6/8 traitements par an Lessivable 20 mm de pluie	72€/ha 1-2 traitements par an Très peu lessivable Nocivité pour les arthropodes et l'Homme	220 € /ha 1 pose par génération Tranquillité après la pose Nécessité d'une surface couverte suffisante Demande beaucoup de main d'œuvre	45€/ha (30kg) 6/8 traitements par an Lessivable ~20 mm de pluie Bonne efficacité en G3 Multi-effet	? €/ha 6/8 traitements par an Efficacité à démontrer en grande parcelle Multi-effet?	0,03€-3€ /ha 2-3 traitements par an Efficace en G2 Multi-effet?

Plus d'informations ?

- Synthèse essais Eudémis 2020, [Cliquez ici](#)
- Synthèse essais Eudémis 2021, [Cliquez ici](#)

Le taux d'humidité relative va aussi jouer sur la survie des œufs, mais celle-ci ne devrait pas baisser suffisamment pour entrainer une mortalité suffisante selon les prévisions actuelles.

Tableau 2 – Taux de survie des œufs (%)

Temp. (°C)	Humidité relative (%)						
	100	90-93	72-77	50-59	30-33	27	0
10,9	44	52	8	8	3	0	0
14,5	90	93	100	84	83	43	8
18,0	100	100	100	100	100	62	31
22,1	100	100	100	93	90	75	70
30,1	93	95	95	83	54	39	11

Source BSV : Les données sont issues du livre « Les Parasites de la vigne, éditions La Vigne, 2007 ».

Au vu de la situation actuelle, dans la majorité des cas, **un traitement ne se justifie pas, en cas de doute appelez nous !**

Dans le cas où il y aurait présence locale de pontes en nombre important et qu'un traitement devient nécessaire, observez les stades des pontes pour traiter au plus proche du stade tête noire (24 à 48h avant éclosion).

Rappel facteurs de réussite du traitement :

C'est la qualité de pulvérisation (sur la zone des grappes, sans mélange, en face par face) ainsi que le positionnement par rapport aux éclosions qui feront l'efficacité des traitements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter vos technicien.ne.s !



HISTORIQUE – RÉSEAU DE SURVEILLANCE


Données issues du réseau de piégeage et de surveillance d'AgroBio Périgord

Données mises à jour le : **28/07/2026**


11 Participants, 21 pièges en 2026

Graphiques synthétisant les principales données de 2026 :

Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Eudémis



Evolution du Réseau de Surveillance 2026 : Cicadelles Vertes



NOUS CONTACTER



Réseau de surveillance ·
Conseil et formations tailles-
greffage-curetage · Réseau
DEPHY-ECOPHYTO ·

c.maisonneuve@agrobioperigord.fr
07 88 02 29 38



Conseil et formations bio
biodynamiques · Coordination
expérimentations · Référent
viticulture biologique pour la
FNAB et l'ITAB ·

e.maille@agrobioperigord.fr
06 87 58 48 50

NOS PARTENAIRES RÉSEAU



NOS RÉSEAUX SOCIAUX

[YouTube](#)

[Groupe Facebook Viti AgroBio Périgord](#)

Parce que...

- ✓ Je soutiens **une agriculture bio et locale en Dordogne**
- ✓ Je veux faire partie d'un réseau de **plus de 650 adhérents**
- ✓ Mon adhésion est **essentielle** pour la vie du réseau et permet de **peser sur les politiques publiques** liées à la bio (aides...)

JE RENOUVELLE MON ADHÉSION

L'adhésion en ligne en 5 min, c'est **par ici** !



• **AGROBIO PÉRIGORD** •
Les Agriculteurs **BIO** de Dordogne

Ou télécharger le
[bulletin d'adhésion](#)
papier

Note : sur présentation de votre justificatif d'adhésion, VBNA (Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine) applique une remise de 40 € à votre cotisation !

**Nouvelle
ADRESSE**

AgroBio Périgord
Pôle Pomport (viticulture)
Route du Lac
24240 POMPORT

Nous partageons les locaux avec les
Vignerons Indépendants de Dordogne

Cette action est réalisée grâce à nos adhérents.

Avec le soutien financier de :

